プロトコールマスター内容

発行日時 2020/3/24 18:00

プロトコール名称 (BS)R-Ben(2コース目以降)；２日間投与用

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫
診療科 血液内科
投薬日数 ２日
休薬日数 26日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2018/ 8/15 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%		
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%		
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%		
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μｌ	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μｌ	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント	１回投与量（補正単位）	速度指示	day(1)	day(2)
Rp 01			+00:00	
点滴注射		点滴静注		
2時間ペースで				
大塚生食注 250ml	1 袋			
Rp 02			+00:00	
点滴注射		点滴静注（側管）		
30分で				
ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg「KCC」	1 袋			
水溶性ハイドロコートン注射液 100mg 2ml	2 瓶			
【暗所保存】				
Rp 03			+00:30	
化学療法(薬局混合)		閉鎖①：静注（側管）		
投与速度はパス参照				
大塚糖液 5% 500ml	1 袋			
大塚糖液 5% 20ml	1 mL			
リツキシマブBS点滴静注	375 mg/㎡			
【混注不適】【冷＆暗保存】				
Rp 04				+00:00
点滴注射		点滴静注		
2時間で				
大塚生食注 250ml	1 袋			
Rp 05				+00:00
点滴注射		点滴静注（側管）		
30分で				
ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg「KCC」	1 袋			
Rp 06			+05:00	
点滴注射		点滴静注（側管）		
10分で				
大塚生食注 50ml	1 瓶			

続き有り

プロトコールマスター内容

発行日時 2020/3/24 18:00

プロトコール名称 (BS)R-Ben(2コース目以降)；2日間投与用

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫
診療科 血液内科
投薬日数 2日
休薬日数 26日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2018/ 8/15 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(1)	day(2)
Rp 07			+05:10	+00:30
化学療法(薬局混合)	閉鎖①：点滴静注（側管）			
60分で	全量250ｍｌになるよう生食を調整			
大塚生食注 250ml	1 mL			
トレアキシン点滴静注用 100mg	90 mg/㎡			
	【混注不適】【暗所保存】			
Rp 08			+05:10	+00:30
化学療法(薬局混合)	閉鎖①：点滴静注（側管）			
トレアキシン溶解用				
注射用水ＰＬ「フソー」100ml	1 瓶			

－以下余白－