

# プロトコルマスター内容

1 / 2

発行日時 2020/3/24 18:00

プロトコル名称 (BS)R-CHOP(1コース目)

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫  
 診療科 血液内科  
 投薬日数 2日  
 休薬日数 19日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 必須  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2018/ 8/15 有効終了日

|                 |      |                   |   |  |  |
|-----------------|------|-------------------|---|--|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない |                   |   |  |  |
| CCr 0~25 ml/分   | %    | GFR 0~25 mL/min   | % |  |  |
| CCr 25~50 ml/分  | %    | GFR 25~50 mL/min  | % |  |  |
| CCr 50~75 ml/分  | %    | GFR 50~75 mL/min  | % |  |  |
| CCr 75~100 ml/分 | %    | GFR 75~100 mL/min | % |  |  |

|                |    |           |  |    |  |
|----------------|----|-----------|--|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し |           |  |    |  |
| BUN mg/dL      | 以上 | Scr mg/dL |  | 以上 |  |

|                |    |         |  |    |  |
|----------------|----|---------|--|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し |         |  |    |  |
| AST U/L        | 以上 | ALT U/L |  | 以上 |  |
| T-Bil mg/dL    | 以上 |         |  |    |  |

|                 |    |                 |  |    |  |
|-----------------|----|-----------------|--|----|--|
| CBCの検査結果値による警告  | 無し |                 |  |    |  |
| 白血球 x百/ $\mu$ l | 以下 | リンパ球 %          |  | 以下 |  |
| 好中球 %           | 以下 | 血小板 x万/ $\mu$ l |  | 以下 |  |
| ヘモグロビン g/dL     | 以下 |                 |  |    |  |

日前までの検査結果を参照

| RpNo  | 薬剤名/手技/コメント  | 1回投与量 (補正単位)                         | 速度指示                        | day(1) | day(2) |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 01 | 点滴注射<br>3時間ペースで開始<br>大塚生食注 (ソフトバック) 500ml<br>メイロン静注 7% 20ml              | 1 袋<br>2 管                           | 点滴静注                        | +00:00 |        |  |  |  |  |  |  |
| Rp 02 | 点滴注射<br>30分で<br>大塚生食注 100ml<br>水溶性ヒドロコト注射液 100mg 2ml                     | 1 瓶<br>2 瓶                           | 点滴静注 (側管)                   | +00:00 |        |  |  |  |  |  |  |
| Rp 03 | 化学療法(薬局混合)<br>投与速度はパス参照<br>大塚糖液 5% 500ml<br>大塚糖液 5% 20ml<br>リツキシマブBS点滴静注 | 1 袋<br>1 mL<br>375 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 (側管)<br>【混注不適】 【冷&暗保存】 | +00:30 |        |  |  |  |  |  |  |
| Rp 04 | 点滴注射<br>30分で<br>クラセトロン点滴静注バッグ 1mg 「KCC」<br>水溶性プレドニン 20mg                 | 1 袋<br>100 mg                        | 点滴静注<br>【暗所保存】              | +00:00 |        |  |  |  |  |  |  |
| Rp 05 | 化学療法(薬局混合)<br>2時間で<br>大塚生食注 (ソフトバック) 500ml<br>エンドキサン注射用 500mg            | 1 袋<br>750 mg/m <sup>2</sup>         | 閉鎖①: 点滴静注<br>【冷所保存】         | +00:30 |        |  |  |  |  |  |  |

続き有り

