

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2020/3/24 18:00

プロトコール名称 (BS)Rit単独(1コース目)

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫
 診療科 血液内科
 投薬日数 1日
 休薬日数 6日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2018/ 8/15 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 3時間ペースで開始 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml メイロン静注 7% 20ml	1 袋 2 管	点滴静注	+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml 水溶性ヒドロコトシト注射液 100mg 2ml	1 瓶 2 瓶	点滴静注 (側管)	+00:30						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 投与速度はパス参照 大塚糖液 5% 500ml 大塚糖液 5% 20ml リツキシマブBS点滴静注	1 袋 1 mL 375 mg/m ²	点滴静注 (側管) 【混注不適】 【冷&暗保存】	+01:00						
			-以下余白-							