

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 ABVD

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫
 診療科 血液内科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 8クール
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2018/11/ 7 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml プロイメンド点滴静注用 150mg	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 【混注不適】 【冷所保存】		+00:00						
Rp 02	点滴注射 180分で ソルデム1輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	点滴静注 1 袋 2 管		+00:00						
Rp 03	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml 注射用ソル・メルコート 40mg	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶		+00:30						
Rp 04	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+01:00						
Rp 05	点滴注射 全開で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	点滴静注 (側管) 1 袋 【混注不適】		+01:00						
Rp 06	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml プレオ注射用 15mg	点滴静注 (側管) MAX 15mg/body 1 袋 10 mg/m ² 【冷所保存】		+01:00						

続き有り

プロトコールマスター内容

2 / 4

発行日時 2020/3/24 18:00

プロトコール名称 ABVD

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫
 診療科 血液内科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 8クール
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2018/11/ 7 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 07	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml ダカルバジン注用 100mg	点滴静注 (側管) 遮光 (ルートも含めて) 1 瓶 375 mg/m ²		+02:00						
Rp 08	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚糖液 5% 100ml トキビルシソ塩酸塩注射用	点滴静注 (側管) 1 瓶 25 mg/m ²		+02:30						
Rp 09	化学療法(薬局混合) 全開で MAX10mg/body 大塚生食注 50ml エクザール注射用 10mg	点滴静注 (側管) 1 瓶 6 mg/m ²		+03:00						
	続き有り									

プロトコルマスター内容

3 / 4

発行日時 2020/3/24 18:00

プロトコル名称 ABVD

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫
 診療科 血液内科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 8クール
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2018/11/ 7 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)					
Rp 01	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml プロイメンド点滴静注用 150mg	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 【混注不適】 【冷所保存】		+00:00					
Rp 02	点滴注射 180分で ソルデム1輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	点滴静注 1 袋 2 管		+00:00					
Rp 03	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml 注射用ソル・メルコート 40mg	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶		+00:30					
Rp 04	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+01:00					
Rp 05	点滴注射 全開で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	点滴静注 (側管) 1 袋 【混注不適】		+01:00					
Rp 06	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml プレオ注射用 15mg	点滴静注 (側管) MAX 15mg/body 1 袋 10 mg/m ² 【冷所保存】		+01:00					

続き有り

プロトコルマスター内容

4 / 4

発行日時 2020/3/24 18:00

プロトコル名称 ABVD

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫
 診療科 血液内科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 8クール
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2018/11/ 7 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/ μ l		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)						
Rp 07	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml ダカルバジン注用 100mg	点滴静注 (側管) 遮光 (ルートも含めて) 1 瓶 375 mg/m ² 【混注不適】 【冷所保存】		+02:00						
Rp 08	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚糖液 5% 100ml トキシル [®] シ塩酸塩注射用	点滴静注 (側管) 1 瓶 25 mg/m ² 【混注不適】		+02:30						
Rp 09	化学療法(薬局混合) 全開で MAX10mg/body 大塚生食注 50ml エクザール注射用 10mg	点滴静注 (側管) 1 瓶 6 mg/m ² 【混注不適】 【冷&暗保存】		+03:00						
-以下余白-										