

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 ADC(減量時)

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫
 診療科 血液内科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 1/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない			
CCr	0~25 ml/分	%	GFR	0~25 mL/min	%
CCr	25~50 ml/分	%	GFR	25~50 mL/min	%
CCr	50~75 ml/分	%	GFR	50~75 mL/min	%
CCr	75~100 ml/分	%	GFR	75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告		無し			
白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照 03:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 2時間で 大塚生食注 250ml	点滴静注 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶	【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+00:30						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 60分で 大塚生食注 100ml 注射用水PL「フソー」100ml アドセトリス点滴静注用 50mg	点滴静注 (側管) 全量100mlになるよう生食を調整 1 mL 1 瓶 1.2 mg/kg	【混注不適】 【冷&暗保存】	+00:30						
-以下余白-										