

プロトコルマスター内容

3 / 4

発行日時 2020/3/24 18:00

プロトコル名称 G-Ben(1コース目)

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫
 診療科 血液内科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		
腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	
肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				
CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 02	点滴注射 2時間ペースで開始 大塚生食注 250ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 04	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml ソル・メドロール静注用 40mg	1 瓶 2 瓶	点滴静注 (側管)	+00:00						
Rp 05	点滴注射 1時間で 大塚生食注 100ml	1 瓶	点滴静注 (側管)	+00:30						
Rp 06	化学療法(薬局混合) 投与速度はパス参照 大塚生食注 250ml ガザイバ点滴静注(1000mg/40ml/V)	210 mL 1000 mg/Body 【混注不適】 【冷&暗保存】	点滴静注 (側管)	+01:30						
			続き有り							

