

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2020/3/24 18:33

プロトコール名称 Mog(2コース目以降)

同一グループ

疾患名 ATLL
 診療科 血液内科
 投薬日数 1日
 休薬日数 6日
 最大クール数 7クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 1/ 8 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照 05:30

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 3時間ペースで開始 Mog終了後2時間で点滴 大塚生食注 250ml	点滴静注 Mog開始時本体止め		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml 水溶性ハイドロコトシ注射液 100mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 2 瓶		+00:00						
Rp 03	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+00:30						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚生食注 250ml ボテリジオ点滴静注 20mg 5ml	点滴静注 (側管) 200 mL 1 mg/kg 【混注不適】【冷&暗保存】		+00:30						
-以下余白-										