



# プロトコールマスター内容

2 / 4

発行日時 2020/3/24 18:20

プロトコール名称 Bor(weekly、静注)

同一グループ

疾患名 MM  
 診療科 血液内科  
 投薬日数 22日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/μl		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照 02:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 1時間で 大塚生食注 250ml	点滴静注  1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で グラネトロン点滴静注パック 1mg 「KCC」 デキサート注射液 6.6mg 2ml  デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 (側管)  1 袋 2 瓶 2 管	【暗所保存】 【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 静注 生理食塩液「フソー」 5ml ベルケイド注射用 3mg	静注 (側管) 前後生食10mlでフラッシュ 0.1 mL 1.3 mg/m <sup>2</sup>	【混注不適】	+00:30						
Rp 04	静脈内注射 静注 大塚生食注 20ml	静注 (側管) 前後フラッシュ用 1 管		+00:30						
			続き有り							



# プロトコルマスター内容

4 / 4

発行日時 2020/3/24 18:20

プロトコル名称 Bor(weekly、静注)

同一グループ

疾患名 MM  
 診療科 血液内科  
 投薬日数 22日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球 %	%	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/ $\mu$ l	x万/ $\mu$ l	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

02:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(22)						
Rp 01	点滴注射 1時間で 大塚生食注 250ml	点滴静注  1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で グラセトン点滴静注パック 1mg 「KCC」 デキサート注射液 6.6mg 2ml  デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 (側管)  1 袋 2 瓶 2 管	【暗所保存】 【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 静注 生理食塩液「フソー」 5ml ベルケイド注射用 3mg	静注 (側管) 前後生食10mlでフラッシュ 0.1 mL 1.3 mg/m <sup>2</sup> 【混注不適】		+00:30						
Rp 04	静脈内注射 静注 大塚生食注 20ml	静注 (側管) 前後フラッシュ用 1 管		+00:30						

—以下余白—