

# プロトコルマスター内容

1 / 2

発行日時 2020/3/24 18:20

プロトコル名称 DBd療法 4~8コース目

同一グループ

疾患名 MM  
 診療科 血液内科  
 投薬日数 11日  
 休薬日数 10日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2018/ 1/31 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		
腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	
肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				
CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/ $\mu$ l		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 3 瓶		+00:00						
			【暗所保存】							
Rp 02	点滴注射 大塚生食注 100ml	点滴静注 1 瓶		+00:30						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 投与速度はパス参照 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml ダラザレックス点滴静注	点滴静注 1 mL 16 mg/kg		+01:00						
			【混注不適】 【冷&暗保存】							
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+04:30						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 生理食塩液「フソー」 5ml ベルケイド注射用 3mg	皮下注 0.1 mL 1.3 mg/m <sup>2</sup>		+04:30			+00:00			
			【混注不適】							

続き有り

# プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2020/3/24 18:20

プロトコール名称 DB d 療法 4~8コース目

同一グループ

疾患名 MM  
 診療科 血液内科  
 投薬日数 11日  
 休薬日数 10日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2018/ 1/31 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/μl		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)			
Rp 05	化学療法(薬局混合) 生理食塩液「フソー」 5ml ベルケイド注射用 3mg	皮下注 0.1 mL 1.3 mg/m <sup>2</sup> 【混注不適】		+00:00			+00:00			
			-以下余白-							