

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2020/3/24 18:20

プロトコール名称 DLd療法 3~6コース目

同一グループ

疾患名 MM
 診療科 血液内科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2018/ 1/30 有効終了日

| | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | | |
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|----|--|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | 以上 | | |

| | | | | | |
|----------------|----|---------|----|--|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | 以上 | | |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|----|--|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| 白血球 x百/μl | 以下 | リンパ球 % | 以下 | | |
| 好中球 % | 以下 | 血小板 x万/μl | 以下 | | |
| ヘモグロビン g/dL | 以下 | | | | |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|-------|--|--------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rp 01 | 点滴注射 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml | 点滴静注 1 瓶 3 瓶 | | +00:00 | | | | | | |
| | | | 【暗所保存】 | | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 大塚生食注 100ml | 点滴静注 1 瓶 | | +00:30 | | | | | | |
| Rp 03 | 化学療法(薬局混合) 投与速度はパス参照 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml ダラザレックス点滴静注 | 点滴静注 1 mL 16 mg/kg | | +01:00 | | | | | | |
| | | | 【混注不適】 【冷&暗保存】 | | | | | | | |
| Rp 04 | 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml | 点滴静注 1 瓶 | | +04:30 | | | | | | |
| | | | 続き有り | | | | | | | |

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2020/3/24 18:20

プロトコール名称 DLd療法 3~6コース目

同一グループ

疾患名 MM
 診療科 血液内科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2018/ 1/30 有効終了日

| | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | | |
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | | |

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (15) | | | | | | |
|-------|--|--------------------------|----------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 01 | 点滴注射 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml | 点滴静注 1 瓶 3 瓶 | 【暗所保存】 | +00:00 | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 大塚生食注 100ml | 点滴静注 1 瓶 | | +00:30 | | | | | | |
| Rp 03 | 化学療法(薬局混合) 投与速度はパス参照 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml ダラザレックス点滴静注 | 点滴静注 1 mL 16 mg/kg | 【混注不適】 【冷&暗保存】 | +01:00 | | | | | | |
| Rp 04 | 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml | 点滴静注 1 瓶 | -以下余白- | +04:30 | | | | | | |