

プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2020/3/25 16:59

プロトコル名称 EP d (3コース目以降)※

同一グループ

疾患名 MM
 診療科 血液内科
 投薬日数 1日
 休薬日数 27日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管	 【暗所保存】	+00:00					
Rp 02	点滴注射 45分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:30					
Rp 03	化学療法(薬局混合) 体重に合わせて生食の用量を調整 大塚生食注 250ml 注射用水PL「フソー」100ml エムブリシチ点滴静注用	点滴静注 1 袋 1 瓶 20 mg/kg	 【混注不適】 【冷&暗保存】	+01:15					
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+04:15					

-以下余白-