







# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 MPB : 静注(weekly)

同一グループ

疾患名 MM  
 診療科 血液内科  
 投薬日数 22日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2015/12/25 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し	
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し	
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告		無し	
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ $\mu$ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照 02:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(22)						
Rp 01	点滴注射 1時間で 大塚生食注 250ml	点滴静注  1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で グラネトロン点滴静注パック 1mg 「KCC」	点滴静注 (側管)  1 袋		+00:00						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 静注 生理食塩液「フソー」 5ml ベルケイド注射用 3mg	静注 (側管) 前後生食10mlでフラッシュ 0.1 mL 1.3 mg/m <sup>2</sup> 【混注不適】		+00:30						
Rp 04	静脈内注射 静注 大塚生食注 20ml	静注 (側管) 前後フラッシュ用 1 管		+00:30						
-以下余白-										

# プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/24 18:21

プロトコル名称 MPB : 静注 (weekly)

同一グループ

疾患名 MM  
 診療科 血液内科  
 投薬日数 22日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2015/12/25 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/ $\mu$ l		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

- ・ベルケイド(静注) : 生食3ml/Aで溶解します。生食は採取量を入力してください。
- ・アルケラン内服 : 6mg/m<sup>2</sup> day1-4
- ・プレドニン内服 : 60mg/m<sup>2</sup> day1-4

コメント (帳票・一覧)

参考文献