

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2020/3/24 18:21

プロトコール名称 VAD療法(制吐剤あり)

同一グループ

疾患名 MM
 診療科 血液内科
 投薬日数 4日
 休薬日数 17日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し	
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し	
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告		無し	
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下
ヘマトクリット g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)
Rp 01	点滴注射 1時間で グレースロソ点滴静注パック 1mg 「KCC」 デキササート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 袋 5 瓶		+00:00			
			【暗所保存】				
Rp 02	点滴注射 1時間で グレースロソ点滴静注パック 1mg 「KCC」 デキササート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 袋 5 瓶			+00:00	+00:00	+00:00
			【暗所保存】				
Rp 03	化学療法(薬局混合) 24時間で 大塚糖液 5% 250ml トキシルビシリン塩酸塩注射用 オンコピン注射用 1mg	点滴静注 遮光にて投与 1 袋 9 mg/m ² 0.4 mg/Body		+01:00	+01:00	+01:00	+01:00
			【混注不適】 【混注不適】 【冷所保存】				

—以下余白—