プロトコールマスター内容

発行日時 2020/3/24 18:21

プロトコール名称 VCD(CPA点滴：皮下注)第1コース

同一グループ

疾患名 MM
診療科 血液内科
投薬日数 11日
休薬日数 10日
最大クール数 1クール
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(1) 05:00	day(2)	day(3)	day(4) 05:00	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01 点滴注射 4時間で 大塚生食注（ソフトバック） 500ml	点滴静注 1 袋		+00:00						
Rp 02 点滴注射 30分で ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg「KCC」 デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注（側管） 1 袋 5 瓶 【暗所保存】		+00:00						
Rp 03 化学療法(薬局混合) 3時間で 大塚生食注（ソフトバック） 500ml エンドキサン注射用 500mg	閉鎖①：点滴静注（側管） 1 袋 500 mg/㎡ 【冷所保存】		+00:30						
Rp 04 化学療法(薬局混合) 皮下注 生理食塩液「フソー」 5ml ベルケイド注射用 3mg	皮下注 0.1 mL 1.3 mg/㎡ 【混注不適】		+03:30			+00:00			

続き有り

プロトコールマスター内容

発行日時 2020/3/24 18:21

プロトコール名称 VCD(CPA点滴：皮下注)第1コース

同一グループ

疾患名 MM
診療科 血液内科
投薬日数 11日
休薬日数 10日
最大クール数 1クール
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%		
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%		
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%		
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
ＢＵＮ mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
ＡＳＴ U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

ＣＢＣの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球	%	以下	
好中球 %	以下	血小板	x万/μl	以下	
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(8) 05:00	day(9)	day(10)	day(11) 05:00			
Rp 01			+00:00						
点滴注射	点滴静注								
4時間で									
大塚生食注（ソフトバック） 500ml	1	袋							
Rp 02			+00:00						
点滴注射	点滴静注（側管）								
30分で									
ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg「KCC」	1	袋							
デキサート注射液 6.6mg 2ml	5	瓶							
		【暗所保存】							
Rp 03			+00:30						
化学療法(薬局混合)	閉鎖①：点滴静注（側管）								
3時間で									
大塚生食注（ソフトバック） 500ml	1	袋							
エンドキサン注射用 500mg	500	mg/㎡							
		【冷所保存】							
Rp 04			+03:30			+00:00			
化学療法(薬局混合)	皮下注								
皮下注									
生理食塩液「フソー」 5ml	0.1	mL							
ベルケイド注射用 3mg	1.3	mg/㎡							
	【混注不適】								

－以下余白－