

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 VCD(CPA点滴：皮下注)第2,3コース

同一グループ

疾患名 MM
 診療科 血液内科
 投薬日数 22日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球	%	以下	
好中球 %	以下	血小板	x万/ μ l	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照 05:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	点滴注射 4時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で グラセプトン点滴静注バッグ 1mg 「KCC」 デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 袋 5 瓶	点滴静注 (側管)	+00:00						
Rp 03	化学療法 (薬局混合) 3時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml エンドキサン注射用 500mg	1 袋 300 mg/m ²	閉鎖①：点滴静注 (側管)	+00:30						
Rp 04	化学療法 (薬局混合) 皮下注 生理食塩液「フソー」 5ml ベルケイド注射用 3mg	0.1 mL 1.3 mg/m ²	皮下注	+03:30						

【暗所保存】
【冷所保存】
【混注不適】
続き有り

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 VCD (CPA点滴：皮下注)第2.3コース

同一グループ

疾患名 MM
 診療科 血液内科
 投薬日数 22日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球	%	以下	
好中球 %	以下	血小板	x万/μl	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照 05:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)					
Rp 01	点滴注射 4時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	点滴静注 1 袋		+00:00					
Rp 02	点滴注射 30分で グラネセロン点滴静注パック 1mg 「KCC」 デキササート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 袋 5 瓶	【暗所保存】	+00:00					
Rp 03	化学療法 (薬局混合) 3時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml エンドキサン注射用 500mg	閉鎖①：点滴静注 (側管) 1 袋 300 mg/m ²	【冷所保存】	+00:30					
Rp 04	化学療法 (薬局混合) 皮下注 生理食塩液「フソー」 5ml バルケイド注射用 3mg	皮下注 0.1 mL 1.3 mg/m ²	【混注不適】	+03:30					

—以下余白—