プロトコールマスター内容

発行日時 2020/3/24 18:36

プロトコール名称 ADC

同一グループ

疾患名 末梢性T細胞性リンパ腫
診療科 血液内科
投薬日数 1日
休薬日数 20日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2020/ 2/18 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%		
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%		
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%		
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
ＢＵＮ mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
ＡＳＴ U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

ＣＢＣの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μｌ	以下	リンパ球	%	以下	
好中球 %	以下	血小板	x万/μｌ	以下	
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント	１回投与量（補正単位）	速度指示	day(1)
Rp 01			+00:00
点滴注射	点滴静注		
2時間で			
大塚生食注 250ml	1 袋		
Rp 02			+00:00
点滴注射	点滴静注（側管）		
30分で			
大塚生食注 100ml	1 瓶		
デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶		
	【暗所保存】		
Rp 03			+00:30
点滴注射	点滴静注（側管）		
全開で			
大塚生食注 50ml	1 瓶		
Rp 04			+00:30
化学療法(薬局混合)	点滴静注（側管）		
60分で	ｱﾄﾞｾﾄﾘｽ1Vあたり注射用水10.5ml溶解		
大塚生食注 250ml	150 mL		
注射用水ＰＬ「フソー」100ml	1 瓶		
アドセトリス点滴静注用 50mg	1.8 mg/kg		
	【混注不適】【冷＆暗保存】		

－以下余白－