

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 Romidepsin

同一グループ

疾患名 末梢性T細胞性リンパ腫  
 診療科 血液内科  
 投薬日数 15日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 必須  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/ 8/13 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球	%	以下	
好中球 %	以下	血小板	x万/ $\mu$ l	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01	点滴注射 100mL/時 大塚生食注 100ml	点滴静注 側管開始時より止め 1 瓶		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶	【暗所保存】	+00:05						
Rp 03	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 全開で 1 瓶		+00:35						
Rp 04	点滴注射 4時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml イストダックス点滴静注用 10mg	点滴静注 (側管) 1 袋 14 mg/m <sup>2</sup>	【混注不適】 【暗所保存】	+00:40						
			続き有り							

# プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2020/3/24 18:36

プロトコール名称 Romidepsin

同一グループ

疾患名 末梢性T細胞性リンパ腫  
 診療科 血液内科  
 投薬日数 15日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 必須  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/ 8/13 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 100mL/時 大塚生食注 100ml		点滴静注 側管開始時より止め 1 瓶	+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml		点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 【暗所保存】	+00:05						
Rp 03	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml		点滴静注 (側管) 全開で 1 瓶	+00:35						
Rp 04	点滴注射 4時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml イストダックス点滴静注用 10mg		点滴静注 (側管) 1 袋 14 mg/m <sup>2</sup> 【混注不適】 【暗所保存】	+00:40						
			続き有り							

# プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2020/3/24 18:36

プロトコール名称 Romidepsin

同一グループ

疾患名 末梢性T細胞性リンパ腫  
 診療科 血液内科  
 投薬日数 15日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 必須  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/ 8/13 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
Rp 01	点滴注射 100mL/時 大塚生食注 100ml	点滴静注 側管開始時より止め 1 瓶		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶	【暗所保存】	+00:05						
Rp 03	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 全開で 1 瓶		+00:35						
Rp 04	点滴注射 4時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml イストダックス点滴静注用 10mg	点滴静注 (側管) 1 袋 14 mg/m <sup>2</sup>	【混注不適】 【暗所保存】	+00:40						
			-以下余白-							