

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 C-mab+CBDCa+5-FU(2コース目以降)

同一グループ

疾患名 頭頸部癌
 診療科 耳鼻咽喉科
 投薬日数 16日
 休薬日数 5日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01	点滴注射 8時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注	16:00						
Rp 02	点滴注射 12時間で ポタコールR輸液 500ml	1 袋	点滴静注		00:00					
Rp 03	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml デキササート注射液 1.65mg 0.5ml	1 瓶 1 瓶 2 管	点滴静注 (側管)		09:30					
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml アーピタックス注射液 100mg 20ml	1 袋 250 mg/m ²	点滴静注 (側管)		10:00					
Rp 05	点滴注射 12時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注		12:00					
Rp 06	点滴注射 90分で 大塚生食注 250ml	1 袋	点滴静注 (側管)		11:00					
	続き有り									

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 C₁mab+CBDC₁+5-FU(2コース目以降)

同一グループ

疾患名 頭頸部癌
 診療科 耳鼻咽喉科
 投薬日数 16日
 休薬日数 5日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 07	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml プロイメンド点滴静注用 150mg	1 瓶 1 瓶	点滴静注 (側管) 【混注不適】 【冷所保存】		12:30					
Rp 08	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1 袋	点滴静注 (側管) 【混注不適】		13:30					
Rp 09	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml カルボプラチン点滴静注液	1 袋 5 AUC	点滴静注 (側管) 【暗所保存】		14:00					
Rp 10	化学療法(薬局混合) 24時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 5-FU注 250mg 5ml	1 袋 800 mg/m ²	点滴静注 (側管) 【冷所保存】		16:00					
Rp 11	点滴注射 12時間で ソルデム3A輸液 500ml	1 袋	点滴静注			00:00	00:00	00:00	00:00	
Rp 12	点滴注射 12時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注			12:00	12:00	12:00	12:00	00:00

続き有り

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 C_{mab}+C_{BDCA}+5-FU(2コース目以降)

同一グループ

疾患名 頭頸部癌
 診療科 耳鼻咽喉科
 投薬日数 16日
 休薬日数 5日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
Rp 15	点滴注射 150分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注		09:30					
Rp 16	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 1 瓶	点滴静注 (側管) 【暗所保存】		09:30					
Rp 17	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml アービタックス注射液 100mg 20ml	1 袋 250 mg/m ²	点滴静注 (側管) 【混注不適】 【冷所保存】		10:00					
			続き有り							

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 Cmab+CBDCA+5-FU(2コース目以降)

同一グループ

疾患名 頭頸部癌
 診療科 耳鼻咽喉科
 投薬日数 16日
 休薬日数 5日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)	day(16)					
Rp 15	点滴注射 150分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注		09:30					
Rp 16	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 1 瓶	点滴静注 (側管)		09:30					
Rp 17	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml アービタックス注射液 100mg 20ml	1 袋 250 mg/m ²	点滴静注 (側管)		10:00					
【混注不適】 【冷所保存】										
-以下余白-										