

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 Cmab+FP(1コース目)

同一グループ

疾患名 頭頸部癌
 診療科 歯科口腔外科
 投薬日数 16日
 休薬日数 5日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/ 8 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01	点滴注射 8時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注	16:00						
Rp 02	点滴注射 8時間で ポタコールR輸液 500ml	1 袋	点滴静注		00:00					
Rp 03	点滴注射 4時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注		08:00					
Rp 04	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml ポララミン注 5mg 1ml	1 瓶 1 瓶 2 管 1 管	点滴静注 (側管)		09:30					
Rp 05	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml アービタックス注射液 100mg 20ml	1 袋 400 mg/m ²	点滴静注 (側管)		10:00					
Rp 06	点滴注射 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注		12:00					

続き有り

プロトコールマスター内容

3 / 6

発行日時 2020/3/24 16:12

プロトコール名称 Cnab+FP(1コース目)

同一グループ

疾患名 頭頸部癌
 診療科 歯科口腔外科
 投薬日数 16日
 休薬日数 5日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/ 8 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 13	点滴注射 30分で マンニトールS注射液 300ml	1 瓶	点滴静注 (側管)		16:30					
Rp 14	化学療法(薬局混合) 24時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 5-FU注 250mg 5ml	1 袋 1000 mg/m ²	点滴静注 (側管)		16:30					
Rp 15	点滴注射 2時間で ソルデム3A輸液 500ml	1 袋	点滴静注		18:00					
Rp 16	点滴注射 4時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注		20:00					
Rp 17	点滴注射 6時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注			00:00	00:00	00:00		
Rp 18	点滴注射 6時間で ポタコールR輸液 500ml	1 袋	点滴静注			06:00	06:00	06:00		
Rp 19	点滴注射 5時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注			12:00	12:00	12:00		

続き有り

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 C-mab+FP(1コース目)

同一グループ

疾患名 頭頸部癌
 診療科 歯科口腔外科
 投薬日数 16日
 休薬日数 5日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/ 8 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 20	点滴注射 7時間で ソルデム3A輸液 500ml	1 袋	点滴静注			17:00	17:00	17:00		
Rp 21	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 1 瓶	点滴静注 (側管)			16:00	16:00	16:00		
Rp 22	化学療法(薬局混合) 24時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 5-FU注 250mg 5ml	1 袋 1000 mg/m ²	点滴静注 (側管)			16:30	16:30	16:30		
Rp 23	点滴注射 12時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注							00:00
Rp 24	点滴注射 12時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注							12:00

続き有り

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 Cnab+FP(1コース目)

同一グループ

疾患名 頭頸部癌
 診療科 歯科口腔外科
 投薬日数 16日
 休薬日数 5日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/ 8 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない			
CCr	0~25 ml/分	%	GFR	0~25 mL/min	%
CCr	25~50 ml/分	%	GFR	25~50 mL/min	%
CCr	50~75 ml/分	%	GFR	50~75 mL/min	%
CCr	75~100 ml/分	%	GFR	75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告		無し			
白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 25	点滴注射 2時間30分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注		09:30					
Rp 26	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ポララミン注 5mg 1ml	1 瓶 1 瓶 1 管	点滴静注 (側管) 【暗所保存】 【暗所保存】		09:30					
Rp 27	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml アービタックス注射液 100mg 20ml	1 袋 250 mg/m ²	点滴静注 (側管) 【混注不適】 【冷所保存】		10:00					
			続き有り							

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 C_{mab}+FP(1コース目)

同一グループ

疾患名 頭頸部癌
 診療科 歯科口腔外科
 投薬日数 16日
 休薬日数 5日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/ 8 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)	day(16)					
Rp 25	点滴注射 2時間30分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注		09:30					
Rp 26	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ポララミン注 5mg 1ml	1 瓶 1 瓶 1 管	点滴静注 (側管)		09:30					
Rp 27	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml アービタックス注射液 100mg 20ml	1 袋 250 mg/m ²	点滴静注 (側管)		10:00					
			-以下余白-							