







# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 weeklyPTX

同一グループ

疾患名 頭頸部癌  
 診療科 耳鼻咽喉科  
 投薬日数 36日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
Rp 01	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml  ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」	1 瓶 1 瓶 1 管	点滴静注   【暗所保存】	+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml	1 瓶	点滴静注	+00:30						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタキセル注	1 袋 100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注  【混注不適】 【暗所保存】	+01:00						
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+02:00						
			続き有り							

# プロトコルマスター内容

5 / 6

発行日時 2020/3/24 16:12

プロトコル名称 weeklyPTX										
同一グループ										
疾患名 頭頸部癌 診療科 耳鼻咽喉科 投薬日数 36日 休薬日数 13日 最大クール数 1クール 心機能の確認 任意 体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式 DuBois式 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日										
腎機能の値による実投与量の割合										
CCr	0~25	mL/分	%	GFR	0~25	mL/min	%			
CCr	25~50	mL/分	%	GFR	25~50	mL/min	%			
CCr	50~75	mL/分	%	GFR	50~75	mL/min	%			
CCr	75~100	mL/分	%	GFR	75~100	mL/min	%			
腎機能の検査結果値による警告										
BUN	mg/dL	無し	以上	Scr	mg/dL	以上				
肝機能の検査結果値による警告										
AST	U/L	無し	以上	ALT	U/L	以上				
T-Bil	mg/dL	無し	以上							
CBCの検査結果値による警告										
白血球	x百/ $\mu$ l	無し	以下	リンパ球	%	以下				
好中球	%	無し	以下	血小板	x万/ $\mu$ l	以下				
ヘモグロビン	g/dL	無し	以下							
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (29)	day (30)	day (31)	day (32)	day (33)	day (34)	day (35)
Rp 01	点滴注射	点滴静注		+00:00						
	30分で									
	大塚生食注 100ml	1 瓶								
	デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶	【暗所保存】							
	ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」	1 管								
Rp 02	点滴注射	点滴静注		+00:30						
	30分で									
	大塚生食注 100ml	1 瓶								
Rp 03	化学療法(薬局混合)	点滴静注		+01:00						
	1時間で									
	大塚生食注 250ml	1 袋								
	パクリタセル注	100 mg/m <sup>2</sup>	【混注不適】 【暗所保存】							
Rp 04	点滴注射	点滴静注		+02:00						
	フラッシュ用									
	大塚生食注 50ml	1 瓶								
続き有り										

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 weeklyPTX

同一グループ

疾患名 頭頸部癌  
 診療科 耳鼻咽喉科  
 投薬日数 36日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (36)					
Rp 01	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml  ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」	点滴静注  1 瓶 1 瓶  1 管	    【暗所保存】	+00:00					
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml	点滴静注  1 瓶		+00:30					
Rp 03	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注  1 袋 100 mg/m <sup>2</sup>	  【混注不適】 【暗所保存】	+01:00					
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注  1 瓶		+02:00					

-以下余白-