

プロトコールマスター内容

| プロトコール名称 weekly PTX | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 同一グループ | | | | | | | | | | |
| 疾患名 軟部肉腫 診療科 整形外科 投薬日数 36日 休薬日数 13日 最大クール数 無制限 心機能の確認 任意 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日 | | | | | | | | | | |
| 腎機能の値による実投与量の割合 | | | | | | | | | | |
| CCr | 0~25 ml/分 | % | GFR | 0~25 mL/min | % | | | | | |
| CCr | 25~50 ml/分 | % | GFR | 25~50 mL/min | % | | | | | |
| CCr | 50~75 ml/分 | % | GFR | 50~75 mL/min | % | | | | | |
| CCr | 75~100 ml/分 | % | GFR | 75~100 mL/min | % | | | | | |
| 腎機能の検査結果値による警告 | | | | | | | | | | |
| BUN | mg/dL | 無し | 以上 | Scr | mg/dL | 以上 | | | | |
| 肝機能の検査結果値による警告 | | | | | | | | | | |
| AST | U/L | 無し | 以上 | ALT | U/L | 以上 | | | | |
| T-Bil | mg/dL | 無し | 以上 | | | | | | | |
| CBCの検査結果値による警告 | | | | | | | | | | |
| 白血球 | x百/ μ l | 無し | 以下 | リンパ球 | % | 以下 | | | | |
| 好中球 | % | 無し | 以下 | 血小板 | x万/ μ l | 以下 | | | | |
| ヘモグロビン | g/dL | 無し | 以下 | | | | | | | |
| 日前までの検査結果を参照 | | | | | | | | | | |
| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
| Rp 01 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」 | 点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 | 【暗所保存】 | +00:00 | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml | 点滴静注 1 瓶 | | +00:30 | | | | | | |
| Rp 03 | 化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注 | 点滴静注 1 袋 100 mg/m ² | 【混注不適】 【暗所保存】 | +01:00 | | | | | | |
| Rp 04 | 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml | 点滴静注 1 瓶 | | +02:00 | | | | | | |
| 続き有り | | | | | | | | | | |

プロトコールマスター内容

2 / 6

発行日時 2020/3/24 16:03

プロトコール名称 weekly PTX

同一グループ

疾患名 軟部肉腫
 診療科 整形外科
 投薬日数 36日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

| | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | | |
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|--|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | | 以上 | |

| | | | | | |
|----------------|----|---------|--|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | | 以上 | |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|--|----|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| 白血球 x百/μl | 以下 | リンパ球 % | | 以下 | |
| 好中球 % | 以下 | 血小板 x万/μl | | 以下 | |
| ヘモグロビン g/dL | 以下 | | | | |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (8) | day (9) | day (10) | day (11) | day (12) | day (13) | day (14) |
|-------|---|--|---------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rp 01 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」 | 点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 | 【暗所保存】 | +00:00 | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml | 点滴静注 1 瓶 | | +00:30 | | | | | | |
| Rp 03 | 化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注 | 点滴静注 1 袋 100 mg/m ² | 【混注不適】 【暗所保存】 | +01:00 | | | | | | |
| Rp 04 | 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml | 点滴静注 1 瓶 | | +02:00 | | | | | | |
| | | | 続き有り | | | | | | | |

プロトコールマスター内容

3 / 6

発行日時 2020/3/24 16:03

プロトコール名称 weekly PTX

同一グループ

疾患名 軟部肉腫
 診療科 整形外科
 投薬日数 36日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

| | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | | |
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|----|--|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | 以上 | | |

| | | | | | |
|----------------|----|---------|----|--|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | 以上 | | |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|----|--|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| 白血球 x百/μl | 以下 | リンパ球 % | 以下 | | |
| 好中球 % | 以下 | 血小板 x万/μl | 以下 | | |
| ヘモグロビン g/dL | 以下 | | | | |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day(15) | day(16) | day(17) | day(18) | day(19) | day(20) | day(21) |
|-------|---|--|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rp 01 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」 | 点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 | 【暗所保存】 | +00:00 | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml | 点滴静注 1 瓶 | | +00:30 | | | | | | |
| Rp 03 | 化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注 | 点滴静注 1 袋 100 mg/m ² | 【混注不適】 【暗所保存】 | +01:00 | | | | | | |
| Rp 04 | 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml | 点滴静注 1 瓶 | | +02:00 | | | | | | |

続き有り

プロトコルマスター内容

6 / 6

発行日時 2020/3/24 16:03

プロトコル名称 weekly PTX

同一グループ

疾患名 軟部肉腫
 診療科 整形外科
 投薬日数 36日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

| | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | | |
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|--|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | | 以上 | |

| | | | | | |
|----------------|----|---------|--|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | | 以上 | |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|--|----|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| 白血球 x百/μl | 以下 | リンパ球 % | | 以下 | |
| 好中球 % | 以下 | 血小板 x万/μl | | 以下 | |
| ヘモグロビン g/dL | 以下 | | | | |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day(36) | | | | | | |
|-------|---|--|-----------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 01 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」 | 点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 | 【暗所保存】 | +00:00 | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml | 点滴静注 1 瓶 | | +00:30 | | | | | | |
| Rp 03 | 化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注 | 点滴静注 1 袋 100 mg/m ² | 【混注不適】 【暗所保存】 | +01:00 | | | | | | |
| Rp 04 | 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml | 点滴静注 1 瓶 | | +02:00 | | | | | | |
| | | | -以下余白- | | | | | | | |