

プロトコルマスター内容

1 / 8

発行日時 2020/3/21 01:16

プロトコル名称 CDDP+DOC(放射線併用) (Day1, 8, 29, 36)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 36日
 休薬日数 13日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/21 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 4.5時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	点滴静注 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 1時間で ソルデム3A輸液 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml	点滴静注 (側管) 1 袋 0.4 管 【混注不適】		+00:00						
Rp 03	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 (側管) 1 袋 【混注不適】 1 瓶 【暗所保存】 2 管 【暗所保存】		+01:00						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml タキソテール点滴静注用	点滴静注 (側管) 1 袋 40 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		+01:30						
Rp 05	点滴注射 10分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+02:30						

続き有り

プロトコールマスター内容

3 / 8

発行日時 2020/3/21 01:16

プロトコール名称 CDDP+DOC(放射線併用) (Day1, 8, 29, 36)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 36日
 休薬日数 13日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/21 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %			以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl			以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 4.5時間で 大塚生食注 (ソフトバック)	500ml	点滴静注 1 袋	+00:00						
Rp 02	点滴注射 1時間で ソルデム3A輸液	500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml	点滴静注 (側管) 1 袋 0.4 管 【混注不適】	+00:00						
Rp 03	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ	0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 (側管) 1 袋 【混注不適】 1 瓶 【暗所保存】 2 管 【暗所保存】	+01:00						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注	250ml タキソテール点滴静注用	点滴静注 (側管) 1 袋 40 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】	+01:30						
Rp 05	点滴注射 10分で 大塚生食注	50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶	+02:30						

続き有り

プロトコールマスター内容

5 / 8

発行日時 2020/3/21 01:16

プロトコール名称 CDDP+DOC(放射線併用) (Day1, 8, 29, 36)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 36日
 休薬日数 13日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/21 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (29)	day (30)	day (31)	day (32)	day (33)	day (34)	day (35)
Rp 01	点滴注射 4.5時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	点滴注射 1時間で ソルデム3A輸液 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml	1 袋 0.4 管	点滴静注 (側管)	+00:00						
Rp 03	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	1 袋 1 瓶 2 管	点滴静注 (側管) 【混注不適】 【暗所保存】	+01:00						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml タキソテール点滴静注用	1 袋 40 mg/m ²	点滴静注 (側管) 【混注不適】 【暗所保存】	+01:30						
Rp 05	点滴注射 10分で 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注 (側管)	+02:30						

続き有り

プロトコールマスター内容

7 / 8

発行日時 2020/3/21 01:16

プロトコール名称 CDDP+DOC(放射線併用) (Day1, 8, 29, 36)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 36日
 休薬日数 13日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/21 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(36)					
Rp 01	点滴注射 4.5時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注	+00:00					
Rp 02	点滴注射 1時間で ソルデム3A輸液 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml	1 袋 0.4 管	点滴静注 (側管)	+00:00					
Rp 03	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	1 袋 【混注不適】 1 瓶 2 管	点滴静注 (側管)	+01:00					
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml タキソテール点滴静注用	1 袋 40 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】	点滴静注 (側管)	+01:30					
Rp 05	点滴注射 10分で 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注 (側管)	+02:30					

続き有り

