

# プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2020/3/21 01:18

プロトコール名称 S-1+CDDP (放射線併用)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌  
 診療科 呼吸器内科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 27日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2020/ 1/21 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %			以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl			以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 5時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	点滴静注 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 1時間で ソルデム3A輸液 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml	点滴静注 (側管) 1 袋 0.4 管 【混注不適】		+00:00						
Rp 03	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg  デキサート注射液 6.6mg 2ml  デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 (側管) 1 袋 【混注不適】 1 瓶 【暗所保存】 2 管 【暗所保存】		+01:00						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	点滴静注 (側管) 全量500mlになるように生食を調整 1 mL 60 mg/m <sup>2</sup> 【混注不適】 【暗所保存】		+01:30						
Rp 05	点滴注射 30分で マンニトールS注射液 300ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+02:30						
Rp 06	点滴注射 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	点滴静注 (側管) 1 袋		+03:00						

-以下余白-

# プロトコールマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/21

01:18

プロトコール名称 S-1+CDDP (放射線併用)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌  
 診療科 呼吸器内科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 27日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2020/ 1/21 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/ $\mu$ l		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

S-1 : 80mg/m<sup>2</sup> Day1~14  
 イメンド内服入力お願いします。  
 ・CDDPと生食の総量が500mlになるよう生食の用量を修正してください。

コメント (帳票・一覧)

参考文献