

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 S-1+CDDP
 同一グループ
 疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 8日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/21 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない			
CCr	0~25 ml/分	%	GFR	0~25 mL/min	%
CCr	25~50 ml/分	%	GFR	25~50 mL/min	%
CCr	50~75 ml/分	%	GFR	50~75 mL/min	%
CCr	75~100 ml/分	%	GFR	75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告		無し			
白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(8)					
Rp 01	点滴注射 5時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注	+00:00					
Rp 02	点滴注射 1時間で ソルデム3A輸液 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml	1 袋 0.4 管	点滴静注 (側管)	+00:00					
Rp 03	点滴注射 30分で アロキシン点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	1 袋 【混注不適】 1 瓶 2 管	点滴静注 (側管)	+01:00					
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	1 mL 60 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】	点滴静注 (側管) 全量500mlになるように生食を調整	+01:30					
Rp 05	点滴注射 30分で マンニトールS注射液 300ml	1 瓶	点滴静注 (側管)	+02:30					
Rp 06	点滴注射 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注 (側管)	+03:00					
-以下余白-									

プロトコールマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/21 01:18

プロトコール名称 S-1+CDDP

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 8日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/21 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/ μ l		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

S-1 : 80mg/m² Day 1~21
 イメンド内服入力お願いします。
 ・CDDPと生食の総量が500mlになるよう生食の用量を修正してください。

コメント (帳票・一覧)

参考文献