



# プロトコルマスター内容

2 / 4

発行日時 2020/3/21 01:54

プロトコル名称 ATE+CBDCA+nab-PTX (※)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)  
 診療科 呼吸器内科  
 投薬日数 15日  
 休薬日数 6日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 09	化学療法(薬局混合) 30分で アブラキサン点滴静注用 100mg	点滴静注 (側管) 生食50mlの空バックに注入 100 mg/m <sup>2</sup>		+01:45						
Rp 11	化学療法(薬局混合) アブラキサン溶解用 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+01:45						
Rp 13	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+02:15						
Rp 15	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚精液 5% 250ml カルボプラチン点滴静注液	点滴静注 (側管) 1 袋 5 AUC		+02:20						
Rp 16	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+03:20						

続き有り

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 ATE+CBDCA+nab-PTX (※)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)

診療科 呼吸器内科

投薬日数 15日

休薬日数 6日

最大クール数 1クール

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 06	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注  1 瓶 1 瓶	【暗所保存】	+00:00						
Rp 07	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注  1 瓶		+00:30						
Rp 10	化学療法(薬局混合) 30分で アブラキサン点滴静注用 100mg	点滴静注 生食50mlの空バックに注入 100 mg/m <sup>2</sup>	【混注不適】 【暗所保存】	+00:35						
Rp 12	化学療法(薬局混合) アブラキサン溶解用 大塚生食注 50ml	点滴静注  1 瓶		+00:35						
Rp 14	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注  1 瓶		+01:05						
			続き有り							

# プロトコルマスター内容

4 / 4

発行日時 2020/3/21 01:54

プロトコル名称 ATE+CBDCA+nab-PTX (※)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)  
 診療科 呼吸器内科  
 投薬日数 15日  
 休薬日数 6日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/ $\mu$ l	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)						
Rp 06	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注  1 瓶 1 瓶		+00:00						
			【暗所保存】							
Rp 07	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注  1 瓶		+00:30						
Rp 10	化学療法(薬局混合) 30分で アブラキサン点滴静注用 100mg	点滴静注 生食50mlの空バックに注入 100 ng/ml <sup>2</sup>		+00:35						
			【混注不適】 【暗所保存】							
Rp 12	化学療法(薬局混合) アブラキサン溶解用 大塚生食注 50ml	点滴静注  1 瓶		+00:35						
Rp 14	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注  1 瓶		+01:05						

—以下余白—

# プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/21 01:54

プロトコル名称 ATE+CBDCa+nab-PTX (※)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)

診療科 呼吸器内科

投薬日数 15日

休薬日数 6日

最大クール数 1クール

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/ $\mu$ l	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

day1~イメンドカプセルのオーダーをお願いします。

コメント (帳票・一覧)

参考文献