

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2020/3/21 01:38

プロトコール名称 ATE+PEM(維持療法)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/28 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %			以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl			以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 1時間30分で 大塚生食注 250ml	点滴静注 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶		+00:00						【暗所保存】
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+00:30						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 1200 mg/Body		+00:35						【混注不適】 【冷&暗保存】
Rp 05	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+01:05						
Rp 06	化学療法(薬局混合) 15分で 大塚生食注 50ml アリムタ注射用	点滴静注 (側管) 1 瓶 500 mg/m ²		+01:10						【混注不適】

- 以下余白 -