

# プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2020/3/21 01:56

プロトコール名称 Bev+CDDP+GEM(※)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)

診療科 呼吸器内科

投薬日数 8日

休薬日数 13日

最大クール数 1クール

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	%	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	x万/μl	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 医師の指示通り 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 投与時間は添付文書参照 大塚生食注 100ml アバステン点滴静注用	1 mL 15 mg/kg	点滴静注 (側管) 【混注不適】 【冷&暗保存】	+00:00						
Rp 03	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注 (側管)	+01:30						
Rp 04	点滴注射 1時間で ソルデム3A輸液 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml	1 袋 0.4 管	点滴静注 (側管) 【混注不適】	+01:35						
Rp 05	点滴注射 15分で アロキン点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	1 袋 1 瓶 2 管	点滴静注 (側管) 【混注不適】 【暗所保存】 【暗所保存】	+02:35						
Rp 06	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚糖液 5% 100ml ゲムシリン点滴静注用	1 瓶 1250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (側管)	+02:50						
			続き有り							



