

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2020/3/21 01:56

プロトコール名称 Bev+PEM(※)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 医師の指示通り 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 投与時間は添付文書参照 大塚生食注 100ml アバスタチン点滴静注用	1 mL 15 mg/kg	点滴静注 (側管) 【混注不適】 【冷&暗保存】	+00:00						
Rp 03	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注 (側管)	+00:30						
Rp 04	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 1 瓶	点滴静注 (側管) 【暗所保存】	+00:45						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 15分で 大塚生食注 50ml アリムタ注射用	1 瓶 500 mg/m ²	点滴静注 (側管) 【混注不適】	+01:15						

-以下余白-