

プロトコルマスター内容

1 / 4

発行日時 2020/3/23 12:59

プロトコル名称 KEY+CBDCA+nab-PTX

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)

診療科 呼吸器内科

投薬日数 15日

休薬日数 6日

最大クール数 4クール

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2019/ 9/ 5 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml	点滴静注 1 瓶		+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml キイトルーダ点滴静注(100mg/4ml/V)	点滴静注 1 瓶 200 mg/Body 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:15						
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:45						
Rp 04	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 1 瓶 【暗所保存】 2 管 【暗所保存】		+00:50						
Rp 07	点滴注射 全開で 側管のルート確保用 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+01:20						
Rp 08	化学療法(薬局混合) 30分で アブラキサ点滴静注用 100mg	点滴静注 (側管) 生食50mlの空バッグに注入 100 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		+01:25						

続き有り

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 KEY+CBDCA+nab-PTX

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌（扁平上皮癌）

診療科 呼吸器内科

投薬日数 15日

休薬日数 6日

最大クール数 4クール

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2019/ 9/ 5 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し	
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し	
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告		無し	
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 05	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 1 瓶	点滴静注 【暗所保存】	+00:00						
Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:30						
Rp 08	化学療法(薬局混合) 30分で アブラキサン点滴静注用 100mg	100 mg/ml	点滴静注 (側管) 生食50mlの空バックに注入 【混注不適】 【暗所保存】	+00:35						
Rp 09	化学療法(薬局混合) アブラキサン溶解用 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注 (側管)	+00:35						
Rp 10	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注 (側管) 続き有り	+01:05						

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 KEY+CBDCA+nab-PTX

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌（扁平上皮癌）

診療科 呼吸器内科

投薬日数 15日

休薬日数 6日

最大クール数 4クール

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2019/ 9/ 5 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)					
Rp 05	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶		+00:00					
			【暗所保存】						
Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:30					
Rp 08	化学療法(薬局混合) 30分で アブラキサン点滴静注用 100mg	点滴静注 (側管) 生食50mlの空バックに注入 100 mg/m ²		+00:35					
			【混注不適】 【暗所保存】						
Rp 09	化学療法(薬局混合) アブラキサン溶解用 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+00:35					
Rp 10	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+01:05					

-以下余白-

プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/23

12:59

プロトコル名称 KEY+CBDCA+nab-PTX

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 4クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 9/ 5 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球	%	以下	
好中球 %	以下	血小板	x万/μl	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

day1~イメンドカプセルのオーダーお願いします。

コメント (帳票・一覧)

参考文献