

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 Bev+NGT (※)

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 5日
 休薬日数 16日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)		
Rp 01	点滴注射 4時間で 大塚生食注 250ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	点滴注射 2時間で 大塚生食注 250ml	1 袋	点滴静注		+00:00	+00:00	+00:00	+00:00		
Rp 03	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキササート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 1 瓶	点滴静注 (側管)	+00:00	+00:00	+00:00	+00:00	+00:00		
Rp 04	化学療法(薬局混合) 投与時間は添付文書参照 大塚生食注 100ml アバスタチン点滴静注用	1 mL 15 mg/kg	点滴静注 (側管)	+01:00						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml ハイカムチン注射用 1.1mg	1 瓶 1.25 mg/m ²	点滴静注 (側管)	+02:30	+01:00	+01:00	+01:00	+01:00		
Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注 (側管) 側管	+03:00	+01:30	+01:30	+01:30	+01:30		
			続き有り							

