

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 CPT-11+CDDP

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 2時間で ヴィーン3G輸液 500ml	点滴静注 1 瓶		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 (側管) 1 袋 【混注不適】 1 瓶 【暗所保存】 2 管 【暗所保存】		+00:00						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml カンプト点滴静注	点滴静注 1 袋 60 mg/m ²		+02:00						
Rp 04	点滴注射 2時間で ソリアセトF輸液 500ml	点滴静注 1 袋		+03:30						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	点滴静注 全量500mlになるように生食を調整 1 mL 60 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		+05:30						
Rp 06	点滴注射 60分で マンニトールS注射液 300ml	点滴静注 1 瓶		+07:30						

続き有り

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 CPT-11+CDDP

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 07	点滴注射 150分で ヴィーン3 G輸液 500ml	1 瓶	点滴静注	+08:30						
Rp 08	点滴注射 2時間で ポタコールR輸液 500ml 7αセト注 20mg 「ト」 2ml	1 袋 0.5 管	点滴静注	+11:00						
				【暗所保存】						
Rp 09	点滴注射 2時間で ソルアセトF輸液 500ml	1 袋	点滴静注	+13:00						
Rp 10	点滴注射 6時間で ポタコールR輸液 500ml 7αセト注 20mg 「ト」 2ml	1 袋 0.5 管	点滴静注	+00:00						
				【暗所保存】						
Rp 11	点滴注射 4時間で ヴィーン3 G輸液 500ml	1 瓶	点滴静注	+06:00						
Rp 12	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	1 瓶 2 管	点滴静注 (側管)	+06:00						
				【暗所保存】						
続き有り										

プロトコルマスター内容

4 / 6

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコル名称 CPT-11+CDDP

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 20	点滴注射 6時間で ソルアセットF 輸液 500ml	1 袋	点滴静注			+18:00				
Rp 21	点滴注射 6時間で ソルアセットF 輸液 500ml	1 袋	点滴静注				+00:00			
Rp 22	点滴注射 6時間で ソルアセットF 輸液 500ml	1 袋	点滴静注				+06:00			
			続き有り							

