

プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコル名称 CPT-11+DOC

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 8日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)					
Rp 01	点滴注射 1時間で 大塚糖液 5% 250ml		点滴静注	+00:00					
		1 袋							
Rp 02	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml		点滴静注 (側管)	+00:00					
		1 袋 【混注不適】 2 管							
			【暗所保存】						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml カンプト点滴静注		点滴静注	+01:00					
		1 袋 60 mg/m ²							
Rp 04	化学療法(薬局混合) 3時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml タキソテール点滴静注用		点滴静注	+03:00					
		1 袋 60 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】							
Rp 05	点滴注射 3時間で ヴィーン3G輸液 500ml		点滴静注	+06:00					
		1 瓶							
			-以下余白-						