





# プロトコルマスター内容

プロトコル名称 CPT-11+MMC

同一グループ

疾患名 婦人科がん  
 診療科 産婦人科  
 投薬日数 15日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球	%	以下	
好中球 %	以下	血小板	x万/μl	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)					
Rp 01	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg  デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注	1 袋 【混注不適】 2 管  【暗所保存】	+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 250ml カンプト点滴静注	点滴静注	1 袋 100 mg/m <sup>2</sup>	+00:30					
Rp 03	点滴注射 3時間で ヴィーン3G輸液 500ml	点滴静注	1 瓶  —以下余白—	+02:00					