

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 GEM+CBDCA

同一グループ

疾患名 婦人科がん  
 診療科 産婦人科  
 投薬日数 8日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2020/ 1/30 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下
ヘモグロビン g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 1時間で 大塚生食注 250ml	点滴静注  1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg  デキサート注射液 6.6mg 2ml  デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 (側管) 本体投与30分後に開始 1 袋 【混注不適】 1 瓶 2 管	【暗所保存】 【暗所保存】	+00:30						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚糖液 5% 100ml ゲムシタピン点滴静注用	点滴静注  1 瓶 1000 mg/m <sup>2</sup>		+01:00						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚糖液 5% 250ml カルボプラチン点滴静注液	点滴静注  1 袋 4 AUC	【暗所保存】	+01:30						
Rp 06	点滴注射 2時間で ポタコールR輸液 500ml	点滴静注  1 袋		+02:30						
Rp 07	点滴注射 2時間で ソルデム3A輸液 500ml	点滴静注  1 袋		+04:30						

続き有り



# プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコル名称 GEM+CBDCA

同一グループ

疾患名 婦人科がん  
 診療科 産婦人科  
 投薬日数 8日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2020/ 1/30 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/ $\mu$ l		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

- ・イメンドの処方お願い致します。

コメント (帳票・一覧)

参考文献