

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 IFO

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 5日
 休薬日数 16日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/29 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)		
Rp 01	点滴注射 6時間で ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	1 袋 1 管	点滴静注		+02:00	+02:00	+02:00			
Rp 02	点滴注射 2時間で ソルアセットD輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	1 袋 1 管	点滴静注	+00:00	+08:00	+08:00				
Rp 03	点滴注射 3時間で ソルアセットD輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	1 袋 1 管	点滴静注				+08:00			
Rp 04	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	1 袋 2 管 【混注不適】	点滴静注 (側管) 【暗所保存】	+01:00						
Rp 05	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	1 瓶 2 管	点滴静注 (側管) 【暗所保存】		+09:00	+09:00				
Rp 06	点滴注射 30分で 大塚生食注 50ml ウロミデキサン注(400mg/4ml/A)	1 瓶 400 mg/m ²	点滴静注 (側管)	+01:30	+09:30	+09:30	+08:30			
			続き有り							

プロトコルマスター内容

2 / 3

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコル名称 IFO

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 5日
 休薬日数 16日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/29 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~ 25 ml/分	%	GFR 0~ 25 mL/min	%
CCr 25~ 50 ml/分	%	GFR 25~ 50 mL/min	%
CCr 50~ 75 ml/分	%	GFR 50~ 75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)
Rp 07	点滴注射 6時間で ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	1 袋 1 管	点滴静注	+02:00	+10:00	+10:00		
Rp 08	点滴注射 3時間で ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	1 袋 1 管	点滴静注				+11:00	
Rp 09	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml イホマイド注射用 1 g	1 袋 2000 mg/m ²	点滴静注 (側管)	+02:00	+10:00	+10:00		
Rp 10	点滴注射 30分で 大塚生食注 50ml ウロミテキサン注 (400mg/4ml/A)	1 瓶 400 mg/m ²	点滴静注 (側管)	+06:00	+14:00	+14:00	+13:00	
Rp 11	点滴注射 4時間で ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	1 袋 1 管	点滴静注	+08:00	+16:00	+16:00		
Rp 12	点滴注射 3時間30分で ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	1 袋 1 管	点滴静注				+14:00	

続き有り

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 IFO

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 5日
 休薬日数 16日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/29 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない
 C C r 0~ 25 ml/分 % G F R 0~ 25 mL/min %
 C C r 25~ 50 ml/分 % G F R 25~ 50 mL/min %
 C C r 50~ 75 ml/分 % G F R 50~ 75 mL/min %
 C C r 75~100 ml/分 % G F R 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
 B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)
Rp 13	点滴注射 30分で 大塚生食注 50ml ウロミテキサン注(400mg/4ml/A)	1 瓶 400 mg/m ²	点滴静注 (側管)	+10:00	+18:00	+18:00	+17:00	
Rp 14	点滴注射 6時間で ソルデム3 A 輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	1 袋 1 管	点滴静注	+12:00	+20:00	+20:00		
Rp 15	静脈内注射 生食ロック用 生食注シリンジ「テルモ」10ml	1 筒	静注				+17:30	
Rp 16	点滴注射 3時間で ソルアセトD 輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	1 袋 1 管	点滴静注					+00:00
Rp 17	点滴注射 3時間で ソルアセトD 輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	1 袋 1 管	点滴静注					+03:00
Rp 18	点滴注射 3時間で ソルデム3 A 輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	1 袋 1 管	点滴静注					+06:00

—以下余白—