

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 NDP単独

同一グループ

疾患名 婦人科がん  
 診療科 産婦人科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 27日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 1時間で 大塚糖液 5% 250ml	点滴静注		+00:00						
		1 袋								
Rp 02	点滴注射 30分で クレンジン点滴静注パック 1mg 「KCC」 デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管)		+00:30						
		1 袋 1 瓶								
			【暗所保存】							
Rp 03	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml アクブラ静注用	点滴静注		+01:00						
		1 袋 100 mg/m <sup>2</sup>								
			【混注不適】 【暗所保存】							
Rp 04	点滴注射 2時間で ソルアセトF輸液 500ml	点滴静注		+03:00						
		1 袋								
Rp 05	点滴注射 2時間で ソルデム1輸液 500ml	点滴静注		+05:00						
		1 袋								

-以下余白-

# プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/24

16:54

プロトコル名称 NDP単独

同一グループ

疾患名 婦人科がん  
 診療科 産婦人科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 27日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/ $\mu$ l		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

- ・ 支持療法内服はパス「2925. アクプラ単独療法」を適応してください。
- ・ day2よりデカドロン錠0.5mg16錠分2 2日間の処方をお願い致します。

コメント (帳票・一覧)

参考文献