

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 TN

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 3/ 9 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 1時間で 大塚糖液 5% 250ml		点滴静注	+00:00						
		1 袋								
Rp 02	点滴注射 15分で クアゼポン点滴静注パック 1mg 「KCC」 デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」		点滴静注 (側管)	+00:00						
		1 袋 1 瓶 2 管 1 管								
Rp 03	点滴注射 45分で 大塚糖液 5% 100ml		点滴静注 (側管)	+00:15						
		1 瓶								
Rp 04	化学療法(薬局混合) 3時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml パクリタセル注		点滴静注	+01:00						
		1 袋 175 mg/m ²								
Rp 05	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml		点滴静注	+04:00						
		1 瓶								
Rp 06	化学療法(薬局混合) 3時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml アクブラ静注用		点滴静注	+04:15						
		1 袋 80 mg/m ²								

続き有り

プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコル名称 TN

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 3/ 9 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/ μ l		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

- ・ day2, 3のデカドロン錠0.5mg16錠分2 2日間の処方をお願い致します。

コメント (帳票・一覧)

参考文献