

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 weekly PTX

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 1日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	%	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	x万/μl	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 1時間で 大塚糖液 5% 250ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」	1 瓶 1 瓶 1 管	点滴静注 (側管) 【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚糖液 5% 250ml パクリタセル注	1 袋 80 mg/m ²	点滴静注 【混注不適】 【暗所保存】	+01:00						
Rp 04	点滴注射 2時間で ヴィーン3G輸液 500ml	1 瓶	点滴静注	+02:00						

-以下余白-