

プロトコルマスター内容

1 / 4

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコル名称 weekly PTX+NDP

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 1時間で 大塚糖液 5% 250ml	点滴静注 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 15分で グラセトン点滴静注パック 1mg 「KCC」 デキササート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」	点滴静注 (側管) 1 袋 1 瓶 1 管	【暗所保存】	+00:00						
Rp 04	点滴注射 45分で 大塚糖液 5% 100ml	点滴静注 1 瓶		+00:15						
Rp 06	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		+01:00						
Rp 07	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+02:00						
Rp 08	化学療法(薬局混合) 3時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml アクプラ静注用	点滴静注 1 袋 80 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		+02:00						

続き有り

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 weekly PTX+NDP

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 09	点滴注射 3時間で ソルアセトF輸液 500ml	1 袋	点滴静注	+05:00						
Rp 10	点滴注射 3時間で ヴィーン3G輸液 500ml	1 瓶	点滴静注	+08:00						
			続き有り							

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 weekly PTX+NDP

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球	%	以下	
好中球 %	以下	血小板	x万/ μ l	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)						
Rp 01	点滴注射 1時間で 大塚糖液 5% 250ml	点滴静注 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 1 管	【暗所保存】	+00:00						
Rp 05	点滴注射 45分で 大塚生食注 100ml	点滴静注 1 瓶		+00:15						
Rp 06	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		+01:00						
Rp 10	点滴注射 3時間で ヴィーン3 G輸液 500ml	点滴静注 1 瓶		+02:00						

-以下余白-

プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/24

16:54

プロトコル名称 weekly PTX+NDP

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %			以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l			以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

- ・支持療法内服はパス「2936. weeklyパクリ+アクプラ療法」を適応してください。
- ・day2よりデカドロン錠0.5mg16錠分2 2日間の処方をお願い致します。

コメント (帳票・一覧)

参考文献