

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 EDP+ミトタン

同一グループ

疾患名 副腎癌
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 4日
 休薬日数 24日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2018/ 8/14 有効終了日

| | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | | |
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|--|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | | 以上 | |

| | | | | | |
|----------------|----|---------|--|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | | 以上 | |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|--|----|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| 白血球 x百/μl | 以下 | リンパ球 % | | 以下 | |
| 好中球 % | 以下 | 血小板 x万/μl | | 以下 | |
| ヘモグロビン g/dL | 以下 | | | | |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | | | |
|-------|--|--|------|---------|---------|---------|---------|--|--|--------|
| Rp 01 | 点滴注射 90分で 大塚生食注 250ml | 点滴静注 1 袋 | | +00:00 | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml | 点滴静注 (側管) 1 袋 【混注不適】 1 瓶 | | +00:00 | | | | | | 【暗所保存】 |
| Rp 03 | 化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml トキソリン塩酸塩注射液 | 点滴静注 (側管) 1 瓶 40 mg/m ² 【混注不適】 | | +00:30 | | | | | | |
| Rp 04 | 点滴注射 2時間で 大塚生食注 250ml | 点滴静注 1 袋 | | | +00:00 | | | | | |
| Rp 05 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml | 点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 | | | +00:00 | | | | | 【暗所保存】 |
| Rp 06 | 化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚糖液 5% 250ml エトキシド点滴静注液 100mg 「サト」 5ml | 点滴静注 (側管) 1 袋 100 mg/m ² | | | +00:30 | | | | | |

続き有り

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 EDP+ミトタン

同一グループ

疾患名 副腎癌
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 4日
 休薬日数 24日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2018/ 8/14 有効終了日

| | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | | |
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|--|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | | 以上 | |

| | | | | | |
|----------------|----|---------|--|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | | 以上 | |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|--|----|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| 白血球 x百/μl | 以下 | リンパ球 % | | 以下 | |
| 好中球 % | 以下 | 血小板 x万/μl | | 以下 | |
| ヘモグロビン g/dL | 以下 | | | | |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | | | |
|-------|--|---|------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| Rp 07 | 点滴注射 6時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml | 点滴静注 1 袋 | | | | +00:00 | | | | |
| Rp 08 | 点滴注射 330分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml | 点滴静注 1 袋 | | | | | +00:00 | | | |
| Rp 09 | 点滴注射 1時間で ソルデム3A輸液 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml | 点滴静注 (側管) 1 袋 0.4 管 【混注不適】 | | | | +00:00 | +00:00 | | | |
| Rp 10 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml | 点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 2 管 | 【暗所保存】 【暗所保存】 | | | +01:00 | +01:00 | | | |
| Rp 11 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml プロイメンド点滴静注用 150mg | 点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 【混注不適】 【冷所保存】 | | | | +01:30 | | | | |
| Rp 12 | 化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚糖液 5% 250ml エトボシド点滴静注液 100mg 「サト」 5ml | 点滴静注 (側管) 1 袋 100 mg/m ² | | | | +02:00 | +01:30 | | | |
| 続き有り | | | | | | | | | | |

