

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 BEP

同一グループ

疾患名 胚細胞腫
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

| | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | | |
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|----|--|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | 以上 | | |

| | | | | | |
|----------------|----|---------|----|--|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | 以上 | | |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|----|--|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| 白血球 x百/μl | 以下 | リンパ球 % | 以下 | | |
| 好中球 % | 以下 | 血小板 x万/μl | 以下 | | |
| ヘモグロビン g/dL | 以下 | | | | |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|-------|---|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rp 01 | 点滴注射 6時間で ソルアセトD輸液 500ml | 1 袋 | 点滴静注 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Rp 02 | 点滴注射 6時間で ソルデム3A輸液 500ml | 1 袋 | 点滴静注 | +06:00 | +06:00 | +06:00 | +06:00 | +06:00 | +06:00 | +06:00 |
| Rp 03 | 点滴注射 30分で アロキシン点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml | 1 袋 【混注不適】 1 瓶 | 点滴静注 (側管) | +09:30 | | | | | | |
| Rp 04 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml | 1 瓶 1 瓶 | 点滴静注 (側管) | | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | | |
| Rp 05 | 点滴注射 30分で マンニトールS注射液 300ml | 1 瓶 | 点滴静注 (側管) | +10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00 | | |
| Rp 06 | 化学療法(薬局混合) 4時間で 大塚生食注 (ソフトバッグ) 500ml シスプラチン点滴静注 | 1 mL 20 mg/m ² 【混注不適】 | 点滴静注 (側管) 全量500mlになるよう生食を調整 【暗所保存】 | +10:30 | +10:30 | +10:30 | +10:30 | +10:30 | | |

続き有り

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 BEP

同一グループ

疾患名 胚細胞腫
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

| | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|----|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | | |
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | | |
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | | 以上 | |
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | | 以上 | |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | | |
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| 白血球 x百/ μ l | 以下 | リンパ球 % | | 以下 | |
| 好中球 % | 以下 | 血小板 x万/ μ l | | 以下 | |
| ヘモグロビン g/dL | 以下 | | | | |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|-------|---|------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rp 07 | 点滴注射 6時間で ソルアセトD輸液 500ml | 1 袋 | 点滴静注 | +12:00 | +12:00 | +12:00 | +12:00 | +12:00 | +12:00 | +12:00 |
| Rp 08 | 点滴注射 30分で マンニトールS注射液 300ml | 1 瓶 | 点滴静注 | +14:30 | +14:30 | +14:30 | +14:30 | +14:30 | | |
| Rp 09 | 化学療法(薬局混合) 3時間で 大塚精液 5% 500ml エトポシド点滴静注液 100mg「サト」 5ml | 1 袋 100 mg/m ² | 点滴静注 (側管) | +15:00 | +15:00 | +15:00 | +15:00 | +15:00 | | |
| Rp 10 | 点滴注射 6時間で ソルデム3A輸液 500ml | 1 袋 | 点滴静注 | +18:00 | +18:00 | +18:00 | +18:00 | +18:00 | +18:00 | +18:00 |
| Rp 12 | 化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml プレオ注射用 15mg | 1 瓶 30 mg/Body | 点滴静注 (側管) | +18:00 | | | | | | |

【冷所保存】
続き有り

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 BEP

同一グループ

疾患名 胚細胞腫
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

| | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | | |
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----|-------|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr | mg/dL | 以上 | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----|-----|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT | U/L | 以上 | |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|--|----|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| 白血球 x百/μl | 以下 | リンパ球 % | | 以下 | |
| 好中球 % | 以下 | 血小板 x万/μl | | 以下 | |
| ヘモグロビン g/dL | 以下 | | | | |

日前までの検査結果を参照 13:00

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (8) | day (9) | day (10) | day (11) | day (12) | day (13) | day (14) |
|-------|--|-------------------|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rp 01 | 点滴注射 6時間で ソルアセトD輸液 500ml | 1 袋 | 点滴静注 | +00:00 | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 6時間で ソルデム3A輸液 500ml | 1 袋 | 点滴静注 | +06:00 | | | | | | |
| Rp 12 | 化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml プレオ注射用 15mg | 1 瓶 30 mg/Body | 点滴静注 (側管) 【冷所保存】 | +10:00 | | | | | | |
| | | | 続き有り | | | | | | | |

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2020/3/21 02:26

プロトコール名称 BEP

同一グループ

疾患名 胚細胞腫
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

| | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | | |
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|--|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | | 以上 | |

| | | | | | |
|----------------|----|---------|--|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | | 以上 | |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|--|----|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | | |
| 白血球 x百/μl | 以下 | リンパ球 % | | 以下 | |
| 好中球 % | 以下 | 血小板 x万/μl | | 以下 | |
| ヘモグロビン g/dL | 以下 | | | | |

日前までの検査結果を参照 11:30

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day(15) | | | | | | |
|-------|--|--------------|-----------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 11 | 点滴注射 4時間で ソルアセトD輸液 500ml | 点滴静注 | | +08:00 | | | | | | |
| Rp 12 | 化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml プレオ注射用 15mg | 点滴静注 (側管) | 1 袋 30 mg/Body 【冷所保存】 | +10:00 | | | | | | |
| | | | -以下余白- | | | | | | | |