

プロトコルマスター内容

1 / 4

発行日時 2020/3/21 02:28

プロトコル名称 GC

同一グループ

疾患名 膀胱癌
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/12/ 7 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下
ヘモグロビン g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 8時間で ソルアセトF輸液 500ml	1 袋	点滴静注	08:00						
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 1 瓶	点滴静注 (側管)	09:30						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚糖液 5% 100ml ゲムシタピン点滴静注用	1 瓶 1000 mg/m ²	点滴静注 (側管)	10:00						
Rp 04	点滴注射 8時間で ソルデム3A輸液 500ml	1 袋	点滴静注	16:00						
Rp 05	点滴注射 6時間で ソルアセトF輸液 500ml	1 袋	点滴静注		00:00					
Rp 06	点滴注射 6時間で ソルデム3A輸液 500ml	1 袋	点滴静注		06:00					

続き有り

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 GC

同一グループ

疾患名 膀胱癌
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/12/ 7 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 07	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 (側管) 1 袋 【混注不適】 1 瓶 2 管			08:30					
Rp 08	点滴注射 30分で マンニトールS注射液 300ml	点滴静注 (側管) 1 瓶			09:30					
Rp 09	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚生食注 (ソフトパック) 500ml シスプラチン点滴静注	点滴静注 (側管) 全量が500mlになるように生食を調 1 mL 70 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】			10:00					
Rp 10	点滴注射 6時間で ソルアセトF輸液 500ml	点滴静注 1 袋			12:00					
Rp 11	点滴注射 30分で マンニトールS注射液 300ml	点滴静注 (側管) 1 瓶			12:00					
Rp 12	点滴注射 6時間で ソルデム3A輸液 500ml	点滴静注 1 袋			18:00					

続き有り

プロトコルマスター内容

3 / 4

発行日時 2020/3/21 02:28

プロトコル名称 GC

同一グループ

疾患名 膀胱癌
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/12/ 7 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		
腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	
肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				
CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
Rp 13	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 250ml	1 袋	点滴静注	09:30						
Rp 14	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 1 瓶	点滴静注 (側管) 【暗所保存】	09:30						
Rp 15	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚糖液 5% 100ml ゲムシタピン点滴静注用	1 瓶 1000 mg/m ²	点滴静注 (側管) 続き有り	10:00						

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 GC

同一グループ

疾患名 膀胱癌
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/12/ 7 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)					
Rp 13	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 250ml	1 袋	点滴静注	09:30					
Rp 14	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 1 瓶	点滴静注 (側管)	09:30					
Rp 15	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚糖液 5% 100ml ゲムシタピン点滴静注用	1 瓶 1000 mg/m ²	点滴静注 (側管)	10:00					
			-以下余白-						