

プロトコルマスター内容

1 / 5

発行日時 2020/3/21 02:28

プロトコル名称 M-VAC

同一グループ

疾患名 膀胱癌
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 22日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 6時間で ソルデム1輸液 500ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	点滴注射 6時間で ソルデム3A輸液 500ml	1 袋	点滴静注	+06:00						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 4時間で 大塚糖液 5% 500ml メイロン静注 7% 20ml メントレキセート点滴静注液	1 袋 1 管 30 mg/m ²	点滴静注 (側管)	+10:00						
Rp 04	点滴注射 6時間で ソルデム1輸液 500ml	1 袋	点滴静注	+12:00						
Rp 05	点滴注射 6時間で ソルデム3A輸液 500ml	1 袋	点滴静注	+18:00						
Rp 06	点滴注射 6時間で ソルデム1輸液 500ml	1 袋	点滴静注		+00:00					
Rp 07	点滴注射 6時間で ソルデム3A輸液 500ml	1 袋	点滴静注		+06:00					

続き有り

プロトコルマスター内容

2 / 5

発行日時 2020/3/21 02:28

プロトコル名称 M-VAC

同一グループ

疾患名 膀胱癌
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 22日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 08	点滴注射 1時間で マンニトールS注射液 300ml	点滴静注 (側管) 1 瓶			+08:00					
Rp 09	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 (側管) 1 袋 【混注不適】 1 瓶 2 管	【暗所保存】 【暗所保存】		+09:00					
Rp 10	化学療法(薬局混合) 4時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	点滴静注 (側管) 全量500mlになるよう生食を調整 1 mL 70 mg/m ² 【混注不適】	【暗所保存】		+10:00					
Rp 11	点滴注射 6時間で ソルデム1輸液 500ml	点滴静注 1 袋			+12:00					
Rp 12	点滴注射 1時間で マンニトールS注射液 300ml	点滴静注 1 瓶			+14:00					
Rp 13	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml エクザール注射用 10mg	点滴静注 (側管) 1 瓶 3 mg/m ² 【混注不適】	【冷&暗保存】		+15:00					
			続き有り							

プロトコルマスター内容

4 / 5

発行日時 2020/3/21 02:28

プロトコル名称 M-VAC

同一グループ

疾患名 膀胱癌
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 22日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照 15:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
Rp 16	点滴注射 6時間で ソルアセトD輸液 500ml	1 袋	点滴静注	+08:00						
Rp 17	化学療法(薬局混合) 4時間で 大塚糖液 5% 500ml メイロン静注 7% 20ml メソトレキセート点滴静注液	1 袋 1 管 30 mg/m ²	点滴静注 (側管)	+10:00						
Rp 18	点滴注射 4時間で ソルデム3A輸液 500ml	1 袋	点滴静注	+14:00						
Rp 19	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml エクザール注射用 10mg	1 瓶 3 mg/m ²	点滴静注 (側管)	+14:00						
			【混注不適】 【冷&暗保存】 続き有り							

