

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 R(BS)R(2~5コース目)

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫
 診療科 血液内科
 投薬日数 1日
 休薬日数 27日
 最大クール数 4クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 5/29 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し	
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し	
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告		無し	
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 2時間ペースで開始 大塚生食注 250ml	点滴静注 1 袋		+00:00					
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml 水性性ハイドロコートン注射液 100mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 2 瓶		+00:30					
Rp 03	化学療法(薬局混合) 投与速度はパス参照 大塚糖液 5% 500ml 大塚糖液 5% 20ml リツキシマブBS点滴静注	点滴静注 (側管) 1 袋 1 mL 375 mg/m ²		+01:00					

【混注不適】 【冷&暗保存】
-以下余白-

プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2021/2/17 18:56

プロトコル名称 R(BS)R(2~5コース目)

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫
 診療科 血液内科
 投薬日数 1日
 休薬日数 27日
 最大クール数 4クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 5/29 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %		以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l		以下
ヘモグロビン g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

リツキシマブBSと5%ブドウ糖液が1:9で混合するよう5%ブドウ糖液をオーダーしてください。
 新投与方法と旧投与方法は、医療者用パスシートで指示してください。
 レブラミド20mg day1~day21に内服

6~12コース目はレブラミド20mg day1~day21に内服

コメント (帳票・一覧)

参考文献