

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:29 1/2

プロトコール名称 【胆】 CDDP+GEM	
同一グループ	
疾患名 胆道癌 診療科 消化器・一般外科 投薬日数 8日 休薬日数 13日 最大クール数 無制限 心機能の確認 任意 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 3/ 8 20:06 承認者 村上 賢次 承認取消日時 承認取消者 更新者 村上 賢次
腎機能の値による実投与量の割合 C C r 0~25 ml/分 % C C r 25~50 ml/分 % C C r 50~75 ml/分 % C C r 75~100 ml/分 %	かけない % G F R 0~25 mL/min % % G F R 25~50 mL/min % % G F R 50~75 mL/min % % G F R 75~100 mL/min %
腎機能の検査結果値による警告 B U N mg/dL	無し 以上 S c r mg/dL 以上
肝機能の検査結果値による警告 A S T U/L T-Bil mg/dL	無し 以上 A L T U/L 以上
C B Cの検査結果値による警告 白血球 x百/ μ l 好中球 % ヘモグロビン g/dL	無し 以下 リンパ球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
日前までの検査結果を参照	
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1 回投与量 (補正単位) 速度指示	day(1) day(2) day(3) day(4) day(5) day(6) day(7)
Rp 01 点滴注射 点滴静注 15分で グラネトロン点滴静注パック 1mg/50ml 「HK」 1 袋 デキサート注射液 6.6mg 2ml 1 瓶 【暗所保存】	+00:00
Rp 02 点滴注射 点滴静注 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 1 袋 【危】硫酸Mg 補正液 1mEq/ml 20ml 1 管 【混注不適】	+00:15
Rp 03 化学療法(薬局混合) 点滴静注 1時間で 全量500mlになるよう調整 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 1 mL シスプラチン点滴静注 25 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】	+01:15
Rp 04 化学療法(薬局混合) 点滴静注 30分で 大塚糖液 5% 100ml 1 瓶 ゲムシタリン点滴静注用 1000 mg/m ²	+02:15
Rp 05 点滴注射 点滴静注 フラッシュ用 大塚生食注 50ml 1 瓶	+02:45
続き有り	

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:29 2/2

プロトコール名称 【胆】 CDDP+GEM	
同一グループ	
疾患名 胆道癌 診療科 消化器・一般外科 投薬日数 8日 休薬日数 13日 最大クール数 無制限 心機能の確認 任意 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 3/ 8 20:06 承認者 村上 賢次 承認取消日時 承認取消者 更新者 村上 賢次
腎機能の値による実投与量の割合 C C r 0~25 ml/分 % C C r 25~50 ml/分 % C C r 50~75 ml/分 % C C r 75~100 ml/分 %	かけない % G F R 0~25 mL/min % % G F R 25~50 mL/min % % G F R 50~75 mL/min % % G F R 75~100 mL/min %
腎機能の検査結果値による警告 B U N mg/dL	無し 以上 S c r mg/dL 以上
肝機能の検査結果値による警告 A S T U/L T-Bil mg/dL	無し 以上 A L T U/L 以上
C B Cの検査結果値による警告 白血球 x百/ μ l 好中球 % ヘモグロビン g/dL	無し 以下 リンパ球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
日前までの検査結果を参照	
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1 回投与量 (補正単位) 速度指示	day(8)
Rp 01 点滴注射 点滴静注 15分で グラネトロン点滴静注パック 1mg/50ml 「HK」 1 袋 デキサート注射液 6.6mg 2ml 1 瓶 【暗所保存】	+00:00
Rp 02 点滴注射 点滴静注 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 1 袋 【危】硫酸Mg 補正液 1mEq/ml 20ml 1 管 【混注不適】	+00:15
Rp 03 化学療法(薬局混合) 点滴静注 1時間で 全量500mlになるよう調整 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 1 mL シスプラチン点滴静注 25 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】	+01:15
Rp 04 化学療法(薬局混合) 点滴静注 30分で 大塚糖液 5% 100ml 1 瓶 ゲムシタリン点滴静注用 1000 mg/m ²	+02:15
Rp 05 点滴注射 点滴静注 フラッシュ用 大塚生食注 50ml 1 瓶	+02:45
-以下余白-	