

プロトコールマスター内容										1 / 3
発行日時 2022/4/28 16:45										
プロトコール名称 【乳】BV+weeklyPTX_1コース目										
同一グループ										
疾患名 乳癌		承認区分	承認済							
診療科 乳腺外科		承認日時	2021/11/15 10:20							
投薬日数 15日		承認者	村上 賢次							
休薬日数 13日		承認取消日時								
最大クール数 1クール		承認取消者								
心機能の確認 任意		更新者	村上 賢次							
体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式										
有効開始日 2021/11/ 9		有効終了日								
腎機能の値による実投与量の割合 かけない										
C C r 0～ 25 ml/分		%	G F R 0～ 25 mL/min	%						
C C r 25～ 50 ml/分		%	G F R 25～ 50 mL/min	%						
C C r 50～ 75 ml/分		%	G F R 50～ 75 mL/min	%						
C C r 75～100 ml/分		%	G F R 75～100 mL/min	%						
腎機能の検査結果値による警告 無し										
B U N mg/dL		以上	S c r mg/dL	以上						
肝機能の検査結果値による警告 無し										
A S T U/L		以上	A L T U/L	以上						
T-Bil mg/dL		以上								
C B Cの検査結果値による警告 無し										
白血球 x百/μ l		以下	リンパ球 %	以下						
好中球 %		以下	血小板 x万/μ l	以下						
ヘマトクリット g/dL		以下								
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+00:00							
Rp 02	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 100ml アバサチン点滴静注用	点滴静注 全量100mLとなるよう調整 1 瓶 10 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗所保存】	+00:05							
Rp 04	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管 【暗所保存】 【暗所保存】	+01:35							
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセキ注	点滴静注 1 袋 90 mg/㎡ 【混注不適】 【暗所保存】	+01:50							
Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+02:50							
続き有り										

プロトコールマスター内容										2 / 3
発行日時 2022/4/28 16:45										
プロトコール名称 【乳】BV+weeklyPTX_1コース目										
同一グループ										
疾患名 乳癌		承認区分	承認済							
診療科 乳腺外科		承認日時	2021/11/15 10:20							
投薬日数 15日		承認者	村上 賢次							
休薬日数 13日		承認取消日時								
最大クール数 1クール		承認取消者								
心機能の確認 任意		更新者	村上 賢次							
体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式										
有効開始日 2021/11/ 9		有効終了日								
腎機能の値による実投与量の割合 かけない										
C C r 0～ 25 ml/分		%	G F R 0～ 25 mL/min	%						
C C r 25～ 50 ml/分		%	G F R 25～ 50 mL/min	%						
C C r 50～ 75 ml/分		%	G F R 50～ 75 mL/min	%						
C C r 75～100 ml/分		%	G F R 75～100 mL/min	%						
腎機能の検査結果値による警告 無し										
B U N mg/dL		以上	S c r mg/dL	以上						
肝機能の検査結果値による警告 無し										
A S T U/L		以上	A L T U/L	以上						
T-Bil mg/dL		以上								
C B Cの検査結果値による警告 無し										
白血球 x百/μ l		以下	リンパ球 %	以下						
好中球 %		以下	血小板 x万/μ l	以下						
ヘマトクリット g/dL		以下								
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
Rp 04	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管 【暗所保存】 【暗所保存】	+00:00							
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセキ注	点滴静注 1 袋 90 mg/㎡ 【混注不適】 【暗所保存】	+00:15							
Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+01:15							
続き有り										

プロトコールマスター内容										3 / 3	
発行日時 2022/4/28 16:45											
プロトコール名称 【乳】BV+weeklyPTX_1コース目											
同一グループ											
疾患名 乳癌		承認区分		承認済							
診療科 乳腺外科		承認日時		2021/11/15 10:20							
投薬日数 15日		承認者		村上 賢次							
休薬日数 13日		承認取消日時									
最大クール数 1クール		承認取消者									
心機能の確認 任意		更新者		村上 賢次							
体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式											
有効開始日 2021/11/ 9		有効終了日									
腎機能の値による実投与量の割合		かけない									
C C r 0～ 25 ml/分		%		G F R 0～ 25 mL/min		%					
C C r 25～ 50 ml/分		%		G F R 25～ 50 mL/min		%					
C C r 50～ 75 ml/分		%		G F R 50～ 75 mL/min		%					
C C r 75～100 ml/分		%		G F R 75～100 mL/min		%					
腎機能の検査結果値による警告		無し									
B U N mg/dL		以上		S c r mg/dL		以上					
肝機能の検査結果値による警告		無し									
A S T U/L		以上		A L T U/L		以上					
T-Bil mg/dL		以上									
C B Cの検査結果値による警告		無し									
白血球 x百/μ l		以下		リンパ球 %		以下					
好中球 %		以下		血小板 x万/μ l		以下					
ヘマトビ'ン g/dL		以下									
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)							
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00							
Rp 03	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 100ml アバスチン点滴静注用	点滴静注 全量100mLとなるよう調整 1 瓶 10 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:05							
Rp 04	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管 【暗所保存】 【暗所保存】		+01:05							
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 90 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		+01:20							
Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+02:20							
ー以下余白ー											

プロトコールマスター内容										1 / 3	
発行日時 2022/4/28 16:45											
プロトコール名称 【乳】BV+weeklyPTX_2コース目～											
同一グループ											
疾患名 乳癌		承認区分		承認済							
診療科 乳腺外科		承認日時		2021/11/15 10:20							
投薬日数 15日		承認者		村上 賢次							
休薬日数 13日		承認取消日時									
最大クール数 無制限		承認取消者									
心機能の確認 任意		更新者		村上 賢次							
体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式											
有効開始日 2021/11/ 9		有効終了日									
腎機能の値による実投与量の割合		かけない									
C C r 0～ 25 ml/分		%		G F R 0～ 25 mL/min		%					
C C r 25～ 50 ml/分		%		G F R 25～ 50 mL/min		%					
C C r 50～ 75 ml/分		%		G F R 50～ 75 mL/min		%					
C C r 75～100 ml/分		%		G F R 75～100 mL/min		%					
腎機能の検査結果値による警告		無し									
B U N mg/dL		以上		S c r mg/dL		以上					
肝機能の検査結果値による警告		無し									
A S T U/L		以上		A L T U/L		以上					
T-Bil mg/dL		以上									
C B Cの検査結果値による警告		無し									
白血球 x百/μ l		以下		リンパ球 %		以下					
好中球 %		以下		血小板 x万/μ l		以下					
ヘマトビ'ン g/dL		以下									
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00							
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml アバスチン点滴静注用	点滴静注 全量100mLとなるよう調整 1 瓶 10 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:05							
Rp 03	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管 【暗所保存】 【暗所保存】		+00:35							
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 90 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		+00:50							
Rp 05	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:50							
続き有り											

プロトコールマスター内容										2 / 3	
発行日時 2022/4/28 16:45											
プロトコール名称 【乳】BV+weeklyPTX_2コース目～											
同一グループ											
疾患名 乳癌		承認区分		承認済							
診療科 乳腺外科		承認日時		2021/11/15 10:20							
投薬日数 15日		承認者		村上 賢次							
休薬日数 13日		承認取消日時									
最大クール数 無制限		承認取消者									
心機能の確認 任意		更新者		村上 賢次							
体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式											
有効開始日 2021/11/ 9		有効終了日									
腎機能の値による実投与量の割合 かけない											
C C r 0～ 25 ml/分		%		G F R 0～ 25 ml/min		%					
C C r 25～ 50 ml/分		%		G F R 25～ 50 ml/min		%					
C C r 50～ 75 ml/分		%		G F R 50～ 75 ml/min		%					
C C r 75～100 ml/分		%		G F R 75～100 ml/min		%					
腎機能の検査結果値による警告 無し											
B U N mg/dL		以上		S c r mg/dL		以上					
肝機能の検査結果値による警告 無し											
A S T U/L		以上		A L T U/L		以上					
T-Bil mg/dL		以上									
C B C の検査結果値による警告 無し											
白血球 x百/μ l		以下		リンパ球 %		以下					
好中球 %		以下		血小板 x万/μ l		以下					
ヘモグロビン g/dL		以下									
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)	
Rp 03	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管 【暗所保存】 【暗所保存】	+00:00								
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセキ注	点滴静注 1 袋 90 mg/㎡ 【混注不適】 【暗所保存】	+00:15								
Rp 05	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+01:15								
	続き右り										

プロトコールマスター内容										3 / 3	
発行日時 2022/4/28 16:45											
プロトコール名称 【乳】BV+weeklyPTX_2コース目～											
同一グループ											
疾患名 乳癌		承認区分		承認済							
診療科 乳腺外科		承認日時		2021/11/15 10:20							
投薬日数 15日		承認者		村上 賢次							
休薬日数 13日		承認取消日時									
最大クール数 無制限		承認取消者									
心機能の確認 任意		更新者		村上 賢次							
体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式											
有効開始日 2021/11/ 9		有効終了日									
腎機能の値による実投与量の割合 かけない											
C C r 0～ 25 ml/分		%		G F R 0～ 25 ml/min		%					
C C r 25～ 50 ml/分		%		G F R 25～ 50 ml/min		%					
C C r 50～ 75 ml/分		%		G F R 50～ 75 ml/min		%					
C C r 75～100 ml/分		%		G F R 75～100 ml/min		%					
腎機能の検査結果値による警告 無し											
B U N mg/dL		以上		S c r mg/dL		以上					
肝機能の検査結果値による警告 無し											
A S T U/L		以上		A L T U/L		以上					
T-Bil mg/dL		以上									
C B C の検査結果値による警告 無し											
白血球 x百/μ l		以下		リンパ球 %		以下					
好中球 %		以下		血小板 x万/μ l		以下					
ヘモグロビン g/dL		以下									
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)							
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+00:00								
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml アバスチン点滴静注用	点滴静注 全量100mLとなるよう調整 1 瓶 10 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗所保存】	+00:05								
Rp 03	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管 【暗所保存】 【暗所保存】	+00:35								
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセキ注	点滴静注 1 袋 90 mg/㎡ 【混注不適】 【暗所保存】	+00:50								
Rp 05	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+01:50								
	ー以下余白ー										