

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 16:45

1 / 1

プロトコール名称 【乳】EPI+CPA(EC)_進行再発(75mg/m²)

同一グループ

疾患名 乳癌
 診療科 乳腺外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 8クール
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2021/11/ 5 19:19
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシン点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 1 瓶 2 管 【暗所保存】		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 5分で 大塚生食注 50ml エビルピシン塩酸塩注射液	閉鎖①:点滴静注 1 瓶 75 mg/m ² 【混注不適】		+00:15					
Rp 03	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml エンドキサン注射液 500mg	閉鎖①:点滴静注 1 瓶 600 mg/m ² 【冷所保存】		+00:20					
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶 -以下余白-		+00:50					

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 16:45

プロトコール名称 【乳】EPI+CPA(EC)_進行再発(75mg/m²)

同一グループ

疾患名 乳癌
 診療科 乳腺外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 8クール
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2021/11/ 5 19:19
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

【必要前投薬処方】

アプレピタントCap (Day1 : 125mg, Day2, 3 : 80mg)

コメント (帳票・一覽)

【必要前投薬処方】

アプレピタントCap (Day1 : 125mg, Day2, 3 : 80mg)

参考文献