

プロトコルマスター内容

1 / 1 6

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】 PER+Tmab+wPTX 術前術後										
同一グループ										
疾患名	乳癌	承認区分	承認済							
診療科	乳腺外科	承認日時	2021/11/ 5 19:27							
投薬日数	84 日	承認者	早坂 大							
休薬日数	0 日	承認取消日時								
最大クール数	1クール	承認取消者								
心機能の確認	必須	更新者	早坂 大							
体表面積 (㎡)	計算式 DuBois式									
有効開始日	2021/11/ 8	有効終了日								
腎機能の値による実投与量の割合										
C C r	0～ 25 ml/分	%	G F R	0～ 25 ml/min	%					
C C r	25～ 50 ml/分	%	G F R	25～ 50 ml/min	%					
C C r	50～ 75 ml/分	%	G F R	50～ 75 ml/min	%					
C C r	75～100 ml/分	%	G F R	75～100 ml/min	%					
腎機能の検査結果値による警告										
B U N	mg/dL	以上	S c r	mg/dL	以上					
肝機能の検査結果値による警告										
A S T	U/L	以上	A L T	U/L	以上					
T-Bil	mg/dL	以上								
C B C の検査結果値による警告										
白血球	x 百 / μ l	以下	リンパ球	%	以下					
好中球	%	以下	血小板	x 万 / μ l	以下					
ヘモグロビン	g/dL	以下								
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+00:00							
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パージェタ点滴静注 420mg/14ml	点滴静注 1 袋 840 mg/Body 【混注不適】 【冷&暗保存】	+00:05							
Rp 03	点滴注射 1時間で 大塚生食注 100ml	点滴静注 パージェタ投与後の経過観察 1 瓶	+01:05							
Rp 04	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 8 mc/kg 【混注不適】 【冷所保存】	+02:05							
Rp 07	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20ml 「ナリ」 ボラミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管 【暗所保存】 【暗所保存】	+03:35							
続き有り										

プロトコルマスター内容

2 / 1 6

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】 PER+Tmab+wPTX 術前術後										
同一グループ										
疾患名	乳癌	承認区分	承認済							
診療科	乳腺外科	承認日時	2021/11/ 5 19:27							
投薬日数	84 日	承認者	早坂 大							
休薬日数	0 日	承認取消日時								
最大クール数	1クール	承認取消者								
心機能の確認	必須	更新者	早坂 大							
体表面積 (㎡)	計算式 DuBois式									
有効開始日	2021/11/ 8	有効終了日								
腎機能の値による実投与量の割合										
C C r	0～ 25 ml/分	%	G F R	0～ 25 ml/min	%					
C C r	25～ 50 ml/分	%	G F R	25～ 50 ml/min	%					
C C r	50～ 75 ml/分	%	G F R	50～ 75 ml/min	%					
C C r	75～100 ml/分	%	G F R	75～100 ml/min	%					
腎機能の検査結果値による警告										
B U N	mg/dL	以上	S c r	mg/dL	以上					
肝機能の検査結果値による警告										
A S T	U/L	以上	A L T	U/L	以上					
T-Bil	mg/dL	以上								
C B C の検査結果値による警告										
白血球	x 百 / μ l	以下	リンパ球	%	以下					
好中球	%	以下	血小板	x 万 / μ l	以下					
ヘモグロビン	g/dL	以下								
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 08	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パージェタ注	点滴静注 1 袋 80 mg/㎡ 【混注不適】 【暗所保存】	+03:50							
Rp 09	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶 続き有り	+04:50							

プロトコルマスター内容

3 / 1 6

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】PER+Tmab+wPTX_術前術後

同一グループ

疾患名 乳癌
診療科 乳腺外科
投薬日数 84日
休薬日数 0日
最大クール数 1クール
心機能の確認 必須
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2021/11/ 5 19:27
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r	0 ~ 25 ml/分	%	G F R	0 ~ 25 mL/min	%
C C r	25 ~ 50 ml/分	%	G F R	25 ~ 50 mL/min	%
C C r	50 ~ 75 ml/分	%	G F R	50 ~ 75 mL/min	%
C C r	75 ~ 100 ml/分	%	G F R	75 ~ 100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

B U N	mg/dL	以上	S c r	mg/dL	以上
-------	-------	----	-------	-------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

A S T	U/L	以上	A L T	U/L	以上
-------	-----	----	-------	-----	----

T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し

白血球	x 百 / μ l	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x 万 / μ l	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手枝/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
------	-------------	---------------	------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

Rp 07	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	【暗所保存】	+00:00						
-------	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--

Rp 08	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ²	【混注不適】 【暗所保存】	+00:15						
-------	--	---	---------------	--------	--	--	--	--	--	--

Rp 09	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15						
-------	---------------------------	-----------------	--	--------	--	--	--	--	--	--

続き有り

プロトコルマスター内容

4 / 1 6

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】PER+Tmab+wPTX_術前術後

同一グループ

疾患名 乳癌
診療科 乳腺外科
投薬日数 84日
休薬日数 0日
最大クール数 1クール
心機能の確認 必須
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2021/11/ 5 19:27
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r	0 ~ 25 ml/分	%	G F R	0 ~ 25 mL/min	%
C C r	25 ~ 50 ml/分	%	G F R	25 ~ 50 mL/min	%
C C r	50 ~ 75 ml/分	%	G F R	50 ~ 75 mL/min	%
C C r	75 ~ 100 ml/分	%	G F R	75 ~ 100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

B U N	mg/dL	以上	S c r	mg/dL	以上
-------	-------	----	-------	-------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

A S T	U/L	以上	A L T	U/L	以上
-------	-----	----	-------	-----	----

T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し

白血球	x 百 / μ l	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下 <td>血小板</td> <td>x 万 / μ l</td> <td>以下</td>	血小板	x 万 / μ l	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下 <td></td> <td></td> <td></td>			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手枝/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
------	-------------	---------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rp 07	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	【暗所保存】	+00:00						
-------	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--

Rp 08	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ²	【混注不適】 【暗所保存】	+00:15						
-------	--	---	---------------	--------	--	--	--	--	--	--

Rp 09	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15						
-------	---------------------------	-----------------	--	--------	--	--	--	--	--	--

続き有り

プロトコルマスター内容

5 / 1 6

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】PER+Tmab+wPTX_術前術後

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	乳腺外科	承認日時	2021/11/ 5 19:27
投薬日数	84日	承認者	早坂 大
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	必須	更新者	早坂 大
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/11/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
C C r 0～25 ml/分	%	G F R 0～25 mL/min	%		
C C r 25～50 ml/分	%	G F R 25～50 mL/min	%		
C C r 50～75 ml/分	%	G F R 50～75 mL/min	%		
C C r 75～100 ml/分	%	G F R 75～100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

C B Cの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μ l	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μ l	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
------	-------------	--------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00						
-------	-------------------------------	-------------	--	--------	--	--	--	--	--	--

Rp 05	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml パージェタ点滴静注 420mg/14ml	点滴静注 1 袋 420 mg/Body 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:05						
-------	---	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Rp 06	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 6 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】		+00:35						
-------	--	---	--	--------	--	--	--	--	--	--

Rp 07	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「リライ」 ボラミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管 【暗所保存】 【暗所保存】		+01:05						
-------	---	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Rp 08	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセキ注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		+01:20						
-------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

続き有り

プロトコルマスター内容

6 / 1 6

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】PER+Tmab+wPTX_術前術後

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	乳腺外科	承認日時	2021/11/ 5 19:27
投薬日数	84日	承認者	早坂 大
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	必須	更新者	早坂 大
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/11/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
C C r 0～25 ml/分	%	G F R 0～25 mL/min	%		
C C r 25～50 ml/分	%	G F R 25～50 mL/min	%		
C C r 50～75 ml/分	%	G F R 50～75 mL/min	%		
C C r 75～100 ml/分	%	G F R 75～100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

C B Cの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μ l	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μ l	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
------	-------------	--------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rp 09	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+02:20						
-------	---------------------------	-------------	--	--------	--	--	--	--	--	--

続き有り

7 / 1 6

發行日時 2022/4/28 16:46

同一グループ

承認区分 承認済
承認日時 2021/11/ 5 19:27
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

CCr	0~25	ml/分	%	GFR	0~25	ml/min	%
CCr	25~50	ml/分	%	GFR	25~50	ml/min	%
CCr	50~75	ml/分	%	GFR	50~75	ml/min	%
CCr	75~100	ml/分	%	GFR	75~100	ml/min	%

肝機能の検査結果値による警告		無し			
A S T	U/L	以上	A L T	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告					
白血球	x百/ μ l	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/ μ l	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下			

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (29)	day (30)	day (31)	day (32)	day (33)	day (34)	day (35)
------	-------------	--------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

[illegible]

Rp 08	化学療法(薬局混合)	点滴静注	+00:15						
	1時間で								
	大塚生食注 250ml	1 袋							
	パクリタール注	80 mg/m ²							
		【混注不適】 【暗所保存】							

Rp 09 点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+01:15						
------------------------------------	-----------------	--------	--	--	--	--	--	--

.....
続き有り

8 / 16

發行日時 2022/4/28 16:46

同グループ

承認区分 承認済
承認日時 2021/11/ 5 19:27
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

CCr	0~25 ml/分	%	GFR	0~25 mL/min	%
CCr	25~50 ml/分	%	GFR	25~50 mL/min	%
CCr	50~75 ml/分	%	GFR	50~75 mL/min	%
CCr	75~100 ml/分	%	GFR	75~100 mL/min	%

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST	U/L	以上	ALT	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告					
白血球	x 百 / μ l	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x 万 / μ l	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下			

● 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (36)	day (37)	day (38)	day (39)	day (40)	day (41)	day (42)
------	-------------	--------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

[illegible]

Rp 08	化学療法(薬局混合)	点滴静注	+00:15			
	1時間で					
	大塚生食注 250ml	1 袋				
	パナソニック注	80 mg/m ²				
		【混注不適】 【暗所保存】				

Rp 09	点滴注射	点滴静注	+01:15						
	5分で								
	大塚生食注 50ml	1 瓶							

続き有り

プロトコルマスター内容

9 / 1 6

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称【乳】PER+Tmab+wPTX 術前術後										
同一グループ										
疾患名	乳癌	承認区分		承認済						
診療科	乳腺外科	承認日時	2021/11/ 5 19:27							
投薬日数	84 日	承認者	早坂 大							
休薬日数	0 日	承認取消日時								
最大クール数	1クール	承認取消者								
心機能の確認	必須	更新者	早坂 大							
体表面積 (㎡) 計算式	DuBois式									
有効開始日	2021/11/ 8	有効終了日								
腎機能の値による実投与量の割合										
C C r	0～25 ml/分	%	G F R	0～25 mL/min	%					
C C r	25～50 ml/分	%	G F R	25～50 mL/min	%					
C C r	50～75 ml/分	%	G F R	50～75 mL/min	%					
C C r	75～100 ml/分	%	G F R	75～100 mL/min	%					
腎機能の検査結果値による警告										
B U N	mg/dL	無し	S c r	mg/dL	以上					
肝機能の検査結果値による警告										
A S T	U/L	無し	A L T	U/L	以上					
T-Bil	mg/dL	以上								
C B C の検査結果値による警告										
白血球	x 百 / μ l	以下	リンパ球	%	以下					
好中球	%	以下	血小板	x 万 / μ l	以下					
ヘモグロビン	g/dL	以下								
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (43)	day (44)	day (45)	day (46)	day (47)	day (48)	day (49)
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+00:00							
Rp 05	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml パージェタ点滴静注 420mg/14ml	点滴静注 1 袋 420 mg/Body 【混注不適】 【冷&暗保存】	+00:05							
Rp 06	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 6 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】	+00:35							
Rp 07	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL「特」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 【暗所保存】 1 管 1 管 【暗所保存】	+01:05							
Rp 08	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタール注	点滴静注 1 袋 80 mg/㎡ 【混注不適】 【暗所保存】	+01:20							
続き有り										

プロトコルマスター内容

1 0 / 1 6

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】 PER+Tmab+wPTX_術前術後										
同一グループ										
疾患名 乳癌		承認区分		承認済						
診療科 乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:27						
投薬日数 84 日		承認者		早坂 大						
休薬日数 0 日		承認取消日時								
最大クール数 1クール		承認取消者								
心機能の確認 必須		更新者		早坂 大						
体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式										
有効開始日 2021/11/ 8		有効終了日								
腎機能の値による実投与量の割合 かけない										
C C r 0～25 ml/分		%		G F R 0～25 mL/min		%				
C C r 25～50 ml/分		%		G F R 25～50 mL/min		%				
C C r 50～75 ml/分		%		G F R 50～75 mL/min		%				
C C r 75～100 ml/分		%		G F R 75～100 mL/min		%				
腎機能の検査結果値による警告 無し										
B U N mg/dL		以上		S c r mg/dL		以上				
肝機能の検査結果値による警告 無し										
A S T U/L		以上		A L T U/L		以上				
T-Bil mg/dL		以上								
C B C の検査結果値による警告 無し										
白血球 x 百 / μ l		以下		リンパ球 %		以下				
好中球 %		以下		血小板 x 万 / μ l		以下				
ヘモグロビン g/dL		以下								
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (43)	day (44)	day (45)	day (46)	day (47)	day (48)	day (49)
Rp 09	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+02:20							
続き有り										

プロトコルマスター内容

1 1 / 1 6

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】PER+Tmab+wPTX 術前術後

同一グループ

疾患名 乳癌
診療科 乳腺外科
投薬日数 84日
休薬日数 0日
最大クール数 1クール
心機能の確認 必須
体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式
有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2021/11/ 5 19:27
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

項目	範囲	単位	割合
C Cr	0～25	ml/分	%
C Cr	25～50	ml/分	%
C Cr	50～75	ml/分	%
C Cr	75～100	ml/分	%
G FR	0～25	ml/min	%
G FR	25～50	ml/min	%
G FR	50～75	ml/min	%
G FR	75～100	ml/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 Ser mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl 以下 リンパ球 %
好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (50)	day (51)	day (52)	day (53)	day (54)	day (55)	day (56)
Rp 07	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL「974」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管		+00:00						
Rp 08	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタール注	点滴静注 1 袋 80 mg/㎡ 【混注不適】 【暗所保存】		+00:15						
Rp 09	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15						

続き有り

プロトコルマスター内容

1 2 / 1 6

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】PER+Tmab+wPTX 術前術後

同一グループ

疾患名 乳癌
診療科 乳腺外科
投薬日数 84日
休薬日数 0日
最大クール数 1クール
心機能の確認 必須
体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式
有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2021/11/ 5 19:27
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

項目	範囲	単位	割合
C Cr	0～25	ml/分	%
C Cr	25～50	ml/分	%
C Cr	50～75	ml/分	%
C Cr	75～100	ml/分	%
G FR	0～25	ml/min	%
G FR	25～50	ml/min	%
G FR	50～75	ml/min	%
G FR	75～100	ml/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 Ser mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl 以下 リンパ球 %
好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (57)	day (58)	day (59)	day (60)	day (61)	day (62)	day (63)
Rp 07	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL「974」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管		+00:00						
Rp 08	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタール注	点滴静注 1 袋 80 mg/㎡ 【混注不適】 【暗所保存】		+00:15						
Rp 09	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15						

続き有り

プロトコルマスター内容

1 3 / 1 6

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】PER+Tmab+wPTX 術前術後

同一グループ

疾患名 乳癌
診療科 乳腺外科
投薬日数 84日
休薬日数 0日
最大クール数 1クール
心機能の確認 必須
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2021/11/ 5 19:27
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

項目	範囲	単位	割合
C Cr	0～25	ml/分	%
C Cr	25～50	ml/分	%
C Cr	50～75	ml/分	%
C Cr	75～100	ml/分	%
G FR	0～25	ml/min	%
G FR	25～50	ml/min	%
G FR	50～75	ml/min	%
G FR	75～100	ml/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

項目	単位	範囲
B UN	mg/dL	以上
S cr	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

項目	単位	範囲
A ST	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上
A LT	U/L	以上

C B C の検査結果値による警告 無し

項目	単位	範囲
白血球	x 百 / μ l	以下
好中球	%	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下
リンパ球	%	以下
血小板	x 万 / μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (64)	day (65)	day (66)	day (67)	day (68)	day (69)	day (70)
------	-------------	---------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+00:00							
-------	-------------------------------	-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Rp 05	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml パージェタ点滴静注 420mg/14ml	点滴静注 1 袋 420 mg/Body 【混注不適】 【冷&暗保存】	+00:05							
-------	---	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Rp 06	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 6 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】	+00:35							
-------	--	---	--------	--	--	--	--	--	--	--

Rp 07	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン 静注液 20mg 20mL 「ナリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管 【暗所保存】 【暗所保存】	+01:05							
-------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Rp 08	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタール注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】	+01:20							
-------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

続き有り

プロトコルマスター内容

1 4 / 1 6

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】PER+Tmab+wPTX 術前術後

同一グループ

疾患名 乳癌
診療科 乳腺外科
投薬日数 84日
休薬日数 0日
最大クール数 1クール
心機能の確認 必須
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2021/11/ 5 19:27
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

項目	範囲	単位	割合
C Cr	0～25	ml/分	%
C Cr	25～50	ml/分	%
C Cr	50～75	ml/分	%
C Cr	75～100	ml/分	%
G FR	0～25	ml/min	%
G FR	25～50	ml/min	%
G FR	50～75	ml/min	%
G FR	75～100	ml/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

項目	単位	範囲
B UN	mg/dL	以上
S cr	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

項目	単位	範囲
A ST	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上
A LT	U/L	以上

C B C の検査結果値による警告 無し

項目	単位	範囲
白血球	x 百 / μ l	以下
好中球	%	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下
リンパ球	%	以下
血小板	x 万 / μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (64)	day (65)	day (66)	day (67)	day (68)	day (69)	day (70)
------	-------------	---------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rp 09	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶 続き有り	+02:20							
-------	---------------------------	---------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

内容 15 / 16
発行日時 2022/4/28 16:46

発行日時 2022/4/28 16:46

同一グループ

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

肝機能の検査結果値による警告		無し		
A S T	U/L	以上	A L T	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告					
白血球	$\times 10^3/\mu l$	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	$\times 10^3/\mu l$	以下
ヘモグロビン	g/dl	以下			

■ 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day(71)	day(72)	day(73)	day(74)	day(75)	day(76)	day(77)
------	-------------	---------------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

[illegible]

Rp 08	化学療法(薬局混合)	点滴静注	+00:15						
	1時間で								
	大塚生食注 250ml	1 袋							
	バクテリア注	80 mg/ml ²							
		【混注不適】 【暗所保存】							

Rp 09	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注	+01:15						
		1 瓶							

.....
続き有り

16 / 16
発行日時 2022/4/28 16:46

発行日時 2022/4/28 16:46

同一グループ

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
C Cr 0~25 ml/分	%	G FR 0~25 mL/min	%
C Cr 25~50 ml/分	%	G FR 25~50 mL/min	%
C Cr 50~75 ml/分	%	G FR 50~75 mL/min	%
C Cr 75~100 ml/分	%	G FR 75~100 mL/min	%

肝機能の検査結果値による警告	無し			
A S T	U/L	A L T	U/L	以上
T-Bil	mg/dL			

CBCの検査結果値による警告					
白血球	x $10^3/\mu\text{L}$	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x $10^3/\mu\text{L}$	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下			

■ 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (78)	day (79)	day (80)	day (81)	day (82)	day (83)	day (84)
------	-------------	---------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

[illegible]

Rp 08	化学療法(薬局混合)	点滴静注	00:15						
	1時間で								
	大塚生食注 250ml	1 袋							
	ハ・列リキセル注	80 mg/ml							
		【混注不適】 【暗所保存】							

Rp 09	点滴注射	点滴静注	+01:15						
	5分で								
	大塚生食注 50ml	1 瓶							

—以下余白—