

# プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 21:08 1/1

プロトコール名称 【大腸】CapeIRI+BV\_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/30 09:34  
 承認者 早坂 大  
 投薬日数 1日  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 休薬日数 20日  
 承認取消者  
 承認取消者  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 更新者 早坂 大  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下  
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg  デキササート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注  1 袋 【混注不適】 1 瓶		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 100ml アパスチン点滴静注用	点滴静注  1 瓶 7.5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:15					
Rp 03	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml カンプト点滴静注	点滴静注  1 袋 200 mg/m <sup>2</sup>		+01:45					
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注  1 瓶		+03:15					

-以下余白-

# プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】CapeIRI+BV\_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/30 09:34  
 承認者 早坂 大  
 投薬日数 1日  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 休薬日数 20日  
 承認取消者  
 承認取消者  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 更新者 早坂 大  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下  
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

Cape : 1600mg/m<sup>2</sup> 2週投与1週休薬

コメント (帳票・一覧)

参考文献

# プロトコールマスター内容

1/1

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】CapeIRI+BV\_2コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/30 09:34  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシン点滴静注バッグ 0.75mg デキササート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 1 瓶		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 100ml アバスタチン点滴静注用	点滴静注 1 瓶 7.5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:15					
Rp 03	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml カンプト点滴静注	点滴静注 1 袋 200 mg/ml		+01:15					
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+02:45					
		-以下余白-							

# プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】CapeIRI+BV\_2コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/30 09:34  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

Cape : 1600mg/m<sup>2</sup> 2週投与1週休薬

コメント (帳票・一覧)

参考文献

# プロトコルマスター内容

発行日時 2022/4/28 21:18

1/1

プロトコル名称 【大腸】CapeIRI+BV\_3コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休業日数 20日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 4/28 21:17  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 ml/分	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 ml/分	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 ml/分	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 ml/分	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下  
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg  デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注  1 袋 【混注不適】 1 瓶		+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml アバスタ点滴静注用	点滴静注  1 瓶 7.5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:15						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注(ソフトバック) 500ml カンプト点滴静注	点滴静注  1 袋 200 mg/m <sup>2</sup>		+00:45						
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注  1 瓶  -以下余白-		+02:15						

# プロトコルマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:18

プロトコル名称 【大腸】CapeIRI+BV\_3コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休業日数 20日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 4/28 21:17  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 ml/分	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 ml/分	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 ml/分	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 ml/分	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下  
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

Cape : 1600mg/m<sup>2</sup> 2週投与1週休薬

コメント (帳票・一覧)

参考文献