



# プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 21:08

3/7

プロトコール名称 【大腸】 Cmab+CPT-11\_1コース目  
 同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 43日  
 休薬日数 6日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/30 09:40  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 S cr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下  
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	中心静脈注射 15分で アロキシン点滴静注バッグ 0.75mg デキササート注射液 6.6mg 2ml ボララミン注 5mg 1ml	中心静脈 (植込カテ) 1 袋 【混注不適】 1 瓶 【暗所保存】 1 管 【暗所保存】		+00:00						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml アービタックス注射液 100mg 20ml	局所持続注入: 静脈内 1 袋 250 mg/ml 【混注不適】 【冷所保存】		+00:15						
Rp 06	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml カンプト点滴静注	局所持続注入: 静脈内 1 袋 150 mg/ml		+01:15						
Rp 07	中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	中心静脈 (植込カテ) 1 瓶		+02:45						
		続き有り								

# プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 21:08

4/7

プロトコール名称 【大腸】 Cmab+CPT-11\_1コース目  
 同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 43日  
 休薬日数 6日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/30 09:40  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 S cr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下  
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
Rp 02	点滴静注 15分で 大塚生食注 50ml デキササート注射液 6.6mg 2ml ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 【暗所保存】 1 管 【暗所保存】		+00:00						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml アービタックス注射液 100mg 20ml	局所持続注入: 静脈内 1 袋 250 mg/ml 【混注不適】 【冷所保存】		+00:15						
Rp 05	中心静脈注射 1時間で 大塚生食注 100ml	中心静脈 (植込カテ) 1 瓶 続き有り		+01:15						





# プロトコルマスター内容

2/7

発行日時 2022/4/28 21:20

プロトコル名称 【大腸】 Cmax+CPT-11\_2コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 43日  
 休薬日数 6日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 4/28 21:20  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 ml/分	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 ml/分	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 ml/分	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 ml/分	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

A S T U/L 以上 A L T U/L 以上

T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下

好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下

ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml  ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注    1 瓶 1 瓶  1 管	【暗所保存】 【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml アービタックス注射液 100mg 20ml	局所持続注入：静脈内   1 袋 250 mg/m <sup>2</sup>	【混注不適】 【冷所保存】	+00:15						
Rp 04	中心静脈注射 1時間で 大塚生食注 100ml	中心静脈 (植込カテ)   1 瓶	続き有り	+01:15						

# プロトコルマスター内容

3/7

発行日時 2022/4/28 21:20

プロトコル名称 【大腸】 Cmax+CPT-11\_2コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 43日  
 休薬日数 6日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 4/28 21:20  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 ml/分	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 ml/分	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 ml/分	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 ml/分	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

A S T U/L 以上 A L T U/L 以上

T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下

好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下

ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
Rp 01	中心静脈注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg  デキサート注射液 6.6mg 2ml  ボララミン注 5mg 1ml	中心静脈 (植込カテ)   1 袋 1 瓶  1 管	【混注不適】 【暗所保存】 【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml アービタックス注射液 100mg 20ml	局所持続注入：静脈内   1 袋 250 mg/m <sup>2</sup>	【混注不適】 【冷所保存】	+00:15						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml カンプト点滴静注	局所持続注入：静脈内   1 袋 150 mg/m <sup>2</sup>		+01:15						
Rp 06	中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	中心静脈 (植込カテ)   1 瓶	続き有り	+02:45						



